

олії 1334 - 1475 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

### 06017055 ЕС Артїміс

Заявник: Євраліс Семанс

### Степ, Лісостеп

Гіпокотиль з наявним помірним антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із слабкою пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка плеската, верхівка від широкотрикутної до загостреної, крила листка відсутні або слабо виражені, наявні помірні вушка. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, але й чітко округлі, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини середні за висотою, з відсутнім галузненням. Кошик напівобернений донизу разом із прямим стеблом, за розміром середній, форма з боку сім'янок злегка випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має дуже сильну смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Середньоранній гібрид олійного напрямку випробування. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 26,0 ц/га, в зоні Лісостепу 28,4 ц/га. Вміст жиру 50,0 - 50,4 %, олеїнової кислоти 87 %, білку 16,2 - 16,9 %. Вихід олії 1308 - 1422 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

### 07017081 ЕС Віскі

Заявник: Євраліс Семанс

### Степ, Лісостеп

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору слабкою пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 29,2 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,2 ц/га, до національних стандартів 4,3 ц/га; в зоні Лісостепу 33,6 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 4,8 ц/га, до національних стандартів 8,3 ц/га. Вміст жиру 49,3 - 50,0%, білку 16,1% - 16,6%. Вихід олії 1457 - 1502 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

### 07017082 ЕС Веніція

Заявник: Євраліс Семанс

### Степ

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору відсутньою або дуже слабкою