

пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки загострена. Листок з великими вушками та відсутніми або слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки щільні, веретинovidні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продуктування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно природною висотою середня. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 29,4 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,5 ц/га, до національних стандартів 4,5 ц/га. Вміст жиру 50,3%, білку 16,5%. Вихід олії 1439 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи, за час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

® 07017083 EGX786

Заявник: Євраліс Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, помірними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки нещільні, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки-чітко видовжена, але й чітко округла, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природною висотою середня, галузнення відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Гібрид має високий вміст олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 26,6 ц/га, гарантована прибавка 0,9 ц/га; в зоні Лісостепу 24,9 ц/га, гарантована прибавка 4,4 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,6 %, білку 16,5 - 17,1 %, олеїнової кислоти 84, 1 - 86,0 %. Вихід олії 1285 - 1576 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017084 ЕС Петунія

Заявник: Євраліс Семанс

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із слабкою пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабо увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабо виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням зігнуті за довжиною, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продуктуванням пилку. Зовнішні листки обгортки чітко округлої та видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, легка охоплюють кошик.

Рослини середні за висотою, з відсутнім галузненням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром середній, форма з боку сім'янок сильно випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість слабка.

Степ, Лісостеп

Степ, Лісостеп