

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

® 06018009 Анастасія

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник:

Приватне підприємство "Наукова селекційно-насінницька фірма "Соевий вік"

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини сорту з проміжним типом росту, відсутнім або дуже слабким ступенем завивання, мають висоту від середньої до високої (91-110 см), сіре опушення, напівстиснуту форму куща.

Час початку цвітіння від дуже раннього до раннього, а час достигання - ранній з наявним опаданням листя.

Стебло нефасційоване, середньої товщини (7,0-12,0 мм), має середню кількість вузлів (10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, ланцетної форми із загостреною формою верхівки.

Квітка має фіолетове забарвлення віночка. Біб світлого кольору, серповидної форми та має середню довжину (40,1-50,0 мм), вузький (менше 9 мм).

Насіння овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та має жовтого кольору рубчик лінійної форми з відсутнім вічком.

Насіння за масою 1000 зерен - дрібне (менше 130 г).

Напряма використання - зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу - 20,4 ц/га, Лісостепу - 24,4 ц/га, Полісся - 20,1 ц/га з вмістом жиру відповідно 20,8; 21,2 і 22,4%, білку - 38,5; 37,4 і 34,8%.

Висота прикріплення нижнього бобу - 10,4-15,1 см. Маса 1000 насінин - 120,6-136,6 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

07018005 Богеміанс

Степ, Полісся

Заявник:

Семенсес Прогрейн ІНК

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотіля, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середньоранній час початку цвітіння та ранній достигання з відсутнім опаданням листя.

☐ Стебло з малою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

☐ Листок - помірно-зеленого кольору та з відсутньою або буже слабкою пухирчастістю. Середній листочок за розміром - середній, овальний та має заокруглену форму верхівки.

☐ Забарвлення квітки - фіолетове.

☐ Біб середньої довжини та вузький, прямої форми. Забарвлення бобу - світло-коричневе.

☐ Насіння - округло-виупуклої форми з основним світло-коричневим забарвленням оболонки. Рубчик насінини жовтого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика - наявний.

☐ Маса 1000 зерен - середня.

Напряма використання - зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2007-209) у зоні Степу - 20,3 ц/га, Полісся - 19,9 ц/га. Вміст жиру відповідно - 20,9; 22,1%. Вміст білку відповідно - 38,2; 35,2%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 10-13 см. Стійкий до посухи, осипання та вилягання.

® 06018012 Вінні

Степ, Лісостеп

Заявник:

Інститут кормів Української академії аграрних наук