

пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки загострена. Листок з великими вушками та відсутніми або слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки щільні, веретинovidні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 29,4 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,5 ц/га, до національних стандартів 4,5 ц/га. Вміст жиру 50,3%, білку 16,5%. Вихід олії 1439 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи, за час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

® 07017083 ЕГХ786

Степ, Лісостеп

Заявник: Євраліс Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки нещільні, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена, але й чітко округла, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природною висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Гібрид має високий вміст олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 26,6 ц/га, гарантована прибавка 0,9 ц/га; в зоні Лісостепу 24,9 ц/га, гарантована прибавка 4,4 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,6 %, білку 16,5 - 17,1 %, олеїнової кислоти 84,1 - 86,0 %. Вихід олії 1285 - 1576 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017084 ЕС Петунія

Степ, Лісостеп

Заявник: Євраліс Семанс

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із слабкою пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабо увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабо виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням зігнуті за довжиною, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки чітко округлої та видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини середні за висотою, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром середній, форма з боку сім'янок сильно випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість слабка.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,8 ц/га; в зоні Лісостепу 27,8 ц/га, гарантована прибавка 7,3 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,7 %, білку 16,3 - 16,5 %. Вихід олії 1387 - 1578 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017031 Евіта

Степ, Лісостеп

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Агросинтез"

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу сильна. Листок середнього розміру із слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла дуже сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 27,7 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,8 ц/га; в умовах Лісостепу 27,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,3 ц/га. Вміст жиру 49,2 - 49,9%, білку 16,2 - 16,8%. Вихід олії 1408 - 1504 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий порти посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 06017032 Європа

Степ, Лісостеп

Заявник: Щербань Сергій Васильович

Гіпокотиль з наявним сильним антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, малий за розміром із слабкою пухирчатістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка від широкотрикутної до загостреної, крила листка відсутні або слабко виражені, вушка помірні. Опушеність верхівки (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко округлої та видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини високі, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром середній, форма з боку сім'янок сильно випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцевидної форми, середня чорного кольору. Має дуже сильну смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

06017049 Ікллор

Степ, Лісостеп

Заявник: Р2н

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу помірна. Листок середнього розміру з відсутньою або дуже слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки