

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,8 ц/га; в зоні Лісостепу 27,8 ц/га, гарантована прибавка 7,3 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,7 %, білку 16,3 - 16,5 %. Вихід олії 1387 - 1578 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017031 Евіта

Степ, Лісостеп

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Агросинтез"

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу сильна. Листок середнього розміру із слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та вушками. Форма поперечного розрізу листка слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла дуже сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірної довжини. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена але й чітко округла, верхівка антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою висока, галузнення середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 27,7 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,8 ц/га; в умовах Лісостепу 27,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,3 ц/га. Вміст жиру 49,2 - 49,9 %, білку 16,2 - 16,8 %. Вихід олії 1408 - 1504 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий порти посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 06017032 Європа

Степ, Лісостеп

Заявник: Щербань Сергій Васильович

Гіпокотиль з наявним сильним антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, малий за розміром із слабкою пухирчатістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабо увігнута, верхівка від широкотрикутної до загостреної, крила листка відсутні або слабо виражені, вушка помірні. Опушеність верхівки (останні 5 см) помірні. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко округлі та видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини високі, з відсутнім галузненням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром середній, форма з боку сім'янок сильно випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має дуже сильну смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

06017049 Ікллор

Степ, Лісостеп

Заявник: Р2Н

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу помірні. Листок середнього розміру з відсутньою або дуже слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки