

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,8 ц/га; в зоні Лісостепу 27,8 ц/га, гарантована прибавка 7,3 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,7 %, білку 16,3 - 16,5 %. Вихід олії 1387 - 1578 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017031 Евіта

Степ, Лісостеп

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Агросинтез"

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу сильна. Листок середнього розміру із слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла дуже сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 27,7 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,8 ц/га; в умовах Лісостепу 27,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,3 ц/га. Вміст жиру 49,2 - 49,9%, білку 16,2 - 16,8%. Вихід олії 1408 - 1504 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий порти посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 06017032 Європа

Степ, Лісостеп

Заявник: Щербань Сергій Васильович

Гіпокотиль з наявним сильним антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, малий за розміром із слабкою пухирчатістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка від широкотрикутної до загостреної, крила листка відсутні або слабко виражені, вушка помірні. Опушеність верхівки (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко округлої та видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини високі, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром середній, форма з боку сім'янок сильно випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має дуже сильну смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

06017049 Ікллор

Степ, Лісостеп

Заявник: Р2н

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу помірна. Листок середнього розміру з відсутньою або дуже слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки

оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 32,0 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,4 ц/га, до національних стандартів 4,1 ц/га; в умовах Лісостепу 29,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,8 ц/га. Вміст жиру 50,9 - 51,1 %, білку 16,0 - 16,9 %. Вихід олії 1571 - 1701 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

05017083 Іоллін

Степ, Лісостеп

Заявник: Р2н

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок середнього розміру, пухирчатість помірна, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середня. Рослина середня, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 28,2 ц/га, гарантована прибавка до стандарту 1,8 ц/га; в зоні Лісостепу 27,1 ц/га. Потенційна урожайність 45,5 ц/га. Вміст жиру 48,0 - 49,8 %, олеїнової кислоти 86,2 %, білку 16,5 - 17,1 %. Вихід олії 1166 - 1341 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017065 Іоллна (РА1001735)

Степ, Лісостеп

Заявник: Р2н

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла відсутня або дуже слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,4 ц/га, в зоні Лісостепу 25,4 ц/га. Вміст жиру 49,5 - 50,1 %, білку 16,8 %. Вихід олії 1304 - 1600 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017087 Імерія КС

Степ, Лісостеп

Заявник: Коссад Семанс ЕС А