

оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природною висотою середня, галузження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 32,0 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,4 ц/га, до національних стандартів 4,1 ц/га; в умовах Лісостепу 29,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,8 ц/га. Вміст жиру 50,9 - 51,1 %, білку 16,0 - 16,9 %. Вихід олії 1571 - 1701 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

05017083 Іоллін

Заявник:

P2H

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилу. Листок середнього розміру, пухирчатість помірна, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабе. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середня. Рослина середня, галузження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 28,2 ц/га, гарантована прибавка до стандарту 1,8 ц/га; в зоні Лісостепу 27,1 ц/га. Потенційна урожайність 45,5 ц/га. Вміст жиру 48,0 - 49,8 %, олеїнової кислоти 86,2 %, білку 16,5 - 17,1 %. Вихід олії 1166 - 1341 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017065 Іоллна (РА1001735)

Заявник:

P2H

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла відсутня або дуже слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природною висотою висока, галузження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,4 ц/га, в зоні Лісостепу 25,4 ц/га. Вміст жиру 49,5 - 50,1 %, білку 16,8 %. Вихід олії 1304 - 1600 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017087 Імерія КС

Заявник:

Коссад Семанс ЕС А

Степ, Лісостеп