

оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 32,0 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,4 ц/га, до національних стандартів 4,1 ц/га; в умовах Лісостепу 29,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,8 ц/га. Вміст жиру 50,9 - 51,1 %, білку 16,0 - 16,9 %. Вихід олії 1571 - 1701 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

05017083 Іоллін

Степ, Лісостеп

Заявник: Р2н

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок середнього розміру, пухирчатість помірна, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушення верхівки стебла слабке. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка середня. Рослина середня, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 28,2 ц/га, гарантована прибавка до стандарту 1,8 ц/га; в зоні Лісостепу 27,1 ц/га. Потенційна урожайність 45,5 ц/га. Вміст жиру 48,0 - 49,8 %, олеїнової кислоти 86,2 %, білку 16,5 - 17,1 %. Вихід олії 1166 - 1341 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017065 Іоллна (РА1001735)

Степ, Лісостеп

Заявник: Р2н

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла відсутня або дуже слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою висока, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,4 ц/га, в зоні Лісостепу 25,4 ц/га. Вміст жиру 49,5 - 50,1 %, білку 16,8 %. Вихід олії 1304 - 1600 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017087 Імерія КС

Степ, Лісостеп

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Антоціанове забарвлення гіпокотилію відсутнє. Листок середнього розміру із слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла відсутня або дуже слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми, за довжиною довгі. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галушення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 28,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,9 ц/га; в зоні Лісостепу 27,9 ц/га, гарантована прибавка 2,0 ц/га. Вміст жиру 50,8 - 51,1 %, білку 16,1 - 16,6 %. Вихід олії 1381 - 1567 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017034 Ілона КЛ

Степ, Лісостеп

Заявник: Доу Агросайенсіс ВмбХ

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок середнього розміру, пухирчатість помірна, зубці грубі, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка довга. Рослина за висотою середня, галушення відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Гібрид має високий вміст олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,0 ц/га; в зоні Лісостепу 25,1 ц/га, гарантована прибавка 0,9 ц/га. Вміст жиру 51,6 - 52,3 %, білку 16,2 %, олеїнової кислоти 82,6 %. Вихід олії 1381 - 1517 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017057 Курсор

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію - слабка. Листок середнього розміру з помірною пухирчатістю, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина низька, галушення відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - маленький, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцевидної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 22,9 ц/га, в зоні Лісостепу 21,9 ц/га. Вміст жиру 50,2 - 50,8 %, білку 16,3%. Вихід олії 1310 - 1324 кг/га. Гібрид відрізняється підвищеним вмістом пальметинової кислоти, стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування