

Антоціанове забарвлення гіпокотилу відсутнє. Листок середнього розміру із слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та великими вушками. Форма попережного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла відсутня або дуже слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми, за довжиною довгі. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галузнення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривлення стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцевидної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 28,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,9 ц/га; в зоні Лісостепу 27,9 ц/га, гарантована прибавка 2,0 ц/га. Вміст жиру 50,8 - 51,1 %, білку 16,1 - 16,6 %. Вихід олії 1381 - 1567 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017034 Ілона КЛ

Заявник: Доу Агросайенсіс ВмбХ

Степ, Лісостеп

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилу. Листок середнього розміру, пухирчатість помірна, зубці грубі, вушка великі. Форма попережного розрізу листка слабо увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка довга. Рослина за висотою середня, галузнення відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широкояйцевидної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Гібрид має високий вміст олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,0 ц/га; в зоні Лісостепу 25,1 ц/га, гарантована прибавка 0,9 ц/га. Вміст жиру 51,6 - 52,3 %, білку 16,2 - 16,5, олеїнової кислоти 82,6 %. Вихід олії 1381 - 1517 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017057 Курсор

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Степ, Лісостеп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу - слабка. Листок середнього розміру з помірно пухирчатістю, зубці дрібні, вушка помірні. Форма попережного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина низька, галузнення відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - маленький, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцевидної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 22,9 ц/га, в зоні Лісостепу 21,9 ц/га. Вміст жиру 50,2 - 50,8 %, білку 16,3%. Вихід олії 1310 - 1324 кг/га. Гібрид відрізняється підвищеним вмістом пальметинової кислоти, стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування