

Антоціанове забарвлення гіпокотилію відсутнє. Листок середнього розміру із слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла відсутня або дуже слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми, за довжиною довгі. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 28,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,9 ц/га; в зоні Лісостепу 27,9 ц/га, гарантована прибавка 2,0 ц/га. Вміст жиру 50,8 - 51,1 %, білку 16,1 - 16,6 %. Вихід олії 1381 - 1567 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017034 Ілона КЛ

Степ, Лісостеп

Заявник: Доу Агросайенсіс ВмбХ

Паросток має помірне антоціанове забарвлення гіпокотилію. Листок середнього розміру, пухирчатість помірна, зубці грубі, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушення верхівки стебла помірне. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності та довжини, помірно-жовтого кольору, вузько-яйцевидної форми. Трубочасті квітки оранжевого кольору. Зовнішні листки обгортки помірно-зеленого кольору, за формою чітко видовжені, верхівка довга. Рослина за висотою середня, галуження відсутнє. Кошик сильно випуклий, середнього розміру. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Сім'янка середнього розміру, широкояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями сім'янки відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Гібрид має високий вміст олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,0 ц/га; в зоні Лісостепу 25,1 ц/га, гарантована прибавка 0,9 ц/га. Вміст жиру 51,6 - 52,3 %, білку 16,2 %, олеїнової кислоти 82,6 %. Вихід олії 1381 - 1517 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017057 Курсор

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію - слабка. Листок середнього розміру з помірною пухирчатістю, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина низька, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - маленький, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцевидної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 22,9 ц/га, в зоні Лісостепу 21,9 ц/га. Вміст жиру 50,2 - 50,8 %, білку 16,3%. Вихід олії 1310 - 1324 кг/га. Гібрид відрізняється підвищеним вмістом пальметинової кислоти, стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування

незначне.

06017042 Ксения

Степ, Лісостеп

Заявник: Науково-дослідний центр "Магроселект"

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із слабкою пухирчастістю. Зубці дрібні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка загострена, крила листка слабко виражені, помірна наявність вушок. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням зігнуті за довжиною, довгії за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини високі, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром середній, форма з боку сім'янок злегка випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, товста чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,7 ц/га; в зоні Лісостепу 28,6 ц/га, гарантована прибавка 3,3 ц/га. Вміст жиру 49,7 - 50,9 %, білку 16,2 - 16,8 %. Вихід олії 1446 - 1502 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017001 Каменярь

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з помірними пухирчастістю, зубцями та вушками.

Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені але й чітко округлі, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцевидної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 26,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,6 ц/га; в умовах Лісостепу 27,1 ц/га, гарантована прибавка 1,8 ц/га. Вміст жиру 49,9 %, білку 16,7 - 17,2 %. Вихід олії 1342 - 1504 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017033 ЛГ 5654 КЛ

Лісостеп

Заявник: Лімагрейн Юроп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю - сильна. Листок середнього розміру з помірною пухирчастістю, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузько-яйцевидної форми та короткі. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, але й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір