

незначне.

### 06017042 Ксения

Степ, Лісостеп

Заявник: Науково-дослідний центр "Магроселект"

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із слабкою пухирчастістю. Зубці дрібні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка загострена, крила листка слабко виражені, помірна наявність вушок. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням зігнуті за довжиною, довгії за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини високі, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром середній, форма з боку сім'янок злегка випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, товста чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,7 ц/га; в зоні Лісостепу 28,6 ц/га, гарантована прибавка 3,3 ц/га. Вміст жиру 49,7 - 50,9 %, білку 16,2 - 16,8 %. Вихід олії 1446 - 1502 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

### ® 07017001 Каменярь

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з помірними пухирчастістю, зубцями та вушками.

Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені але й чітко округлі, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 26,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,6 ц/га; в умовах Лісостепу 27,1 ц/га, гарантована прибавка 1,8 ц/га. Вміст жиру 49,9 %, білку 16,7 - 17,2 %. Вихід олії 1342 - 1504 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

### 06017033 ЛГ 5654 КЛ

Лісостеп

Заявник: Лімагрейн Юроп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю - сильна. Листок середнього розміру з помірною пухирчастістю, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та короткі. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, але й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір

зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина середньої висоти, галушення відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібною форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування в зоні Лісостепу становила 29,0 ц/га. Вміст жиру 50,4 %, білку 16,3 %. Вихід олії 1583 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017089 ЛГ5451ХО КЛ

Лісостеп

Заявник: Лімагрейн Юроп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу - помірна. Листок середнього розміру з помірно пухирчастістю, зубці помірні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка - слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, але й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина середньої висоти, галушення відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - маленький, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібною форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність в зоні Лісостепу за час випробування становила 26,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,3 ц/га. Вміст жиру 48,2 %, білку 17,5 %. Вихід олії 1460 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017090 ЛГ5663 КЛ

Степ

Заявник: Лімагрейн Юроп

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та грубими зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна.

Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Галушення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із стеблом. Кошик за розміром середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 33,6 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 3,1 ц/га, до національного стандарту 2,5 ц/га. Вміст жиру 50,2%, білку 16,6%. Вихід олії 1597 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий проти посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

® 07017092 ЛГ5658 КЛ

Степ

Заявник: Лімагрейн Юроп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, грубими зубцями та