

зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування в зоні Лісостепу становила 29,0 ц/га. Вміст жиру 50,4 %, білку 16,3 %. Вихід олії 1583 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017089 ЛГ5451ХО КЛ

Заявник: Лімагрейн Юроп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу - помірна. Листок середнього розміру з помірно пухирчастістю, зубці помірні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка - слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, але й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє.

Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - маленький, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність в зоні Лісостепу за час випробування становила 26,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,3 ц/га. Вміст жиру 48,2 %, білку 17,5 %. Вихід олії 1460 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017090 ЛГ5663 КЛ

Заявник: Лімагрейн Юроп

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та грубими зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна.

Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із стеблом. Кошик за розміром середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 33,6 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 3,1 ц/га, до національного стандарту 2,5 ц/га. Вміст жиру 50,2%, білку 16,6%. Вихід олії 1597 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий проти посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

® 07017092 ЛГ5658 КЛ

Заявник: Лімагрейн Юроп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, грубими зубцями та

Лісостеп

Степ

Степ