

помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором сіра, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 28,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,4 ц/га. Вміст жиру 51,4 %, білку 16,2 %. Вихід олії 1496 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, посухи, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017093 ЛГ5550

Степ, Лісостеп

Заявник: Лімагрейн Юроп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, грубими зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжена, округла, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, широко- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями дуже сильна, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,5 ц/га; в зоні Лісостепу 27,2 ц/га, гарантована прибавка 1,3 ц/га. Вміст жиру 49,1 - 50,6 %, білку 16,4 - 16,6 %. Вихід олії 1456 - 1570 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017094 ЛГ5370

Степ, Лісостеп

Заявник: Лімагрейн Юроп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика маленький, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,7 ц/га, в зоні Лісостепу 26,1 ц/га. Вміст жиру 50,2 %, білку 16,4 %. Вихід олії 1434 - 1557 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017047 Летізія

Степ, Лісостеп

Заявник: Маїсадур Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру із слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 29,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,7 ц/га; в умовах Лісостепу 27,7 ц/га. Вміст жиру 50,1 - 50,1%, білку 16,0 - 16,8 %. Вихід олії 1514 - 1660 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017008 Ларісса

Степ, Лісостеп

Заявник: Кволіті Кропс Агро СРЛ

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з відсутня або дуже слабкою пухирчатістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі плеската, форма верхівки загострена. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) відсутня або дуже слабка. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із стеблом. Кошик за розміром середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 27,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,6 ц/га; в зоні Лісостепу 30,1 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,2 ц/га, до національних стандартів 4,8 ц/га. Вміст жиру 49,2 - 49,7%, білку 16,7 - 17,1%. Вихід олії 1410 - 1594 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи. Ураження хворобами і пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

07017056 Максимус

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена, але й чітко округла, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природною висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.