

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,5 ц/га; в зоні Лісостепу 24,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 4,4 ц/га. Вміст жиру 49,8 - 50,5 %, олеїнової кислоти 74,6 - 75,8 %, білку 16,5%. Вихід олії 1315 - 1461 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи, генетично стійкий до гербіцидів групи ІМІ. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

Степ, Лісостеп

06017048 MAC 91A

Заявник:

Маїсадур Семанс

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з помірно пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки широкотрикутна. Листок з помірними вушками та слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, зігнуті за довжиною, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві.

Продуктування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки темний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою висока. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 31,3 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,7 ц/га, до національних стандартів 3,4 ц/га; в умовах Лісостепу 28,2 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,2 ц/га. Вміст жиру 49,2 - 49,5%, білку 16,7 - 17,5%. Вихід олії 1462 - 1670 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

Степ, Лісостеп

06017050 MAC 920Л

Заявник:

Маїсадур Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма попережного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослини низькі, галузження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) плеската. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Гібрид має високий вміст олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,7 ц/га, в зоні Лісостепу 27,2 ц/га. Вміст жиру 48,1 - 49,6 %, олеїнової кислоти 84 %, білку 16,9 - 17,6 %. Вихід олії 1336 - 1433 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

Степ

06017051 MAC 95IP

Заявник:

Маїсадур Семанс

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з помірно пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі плеската, форма верхівки загострена. Листок з помірними вушками та слабо