

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високи вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,5 ц/га; в зоні Лісостепу 24,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 4,4 ц/га. Вміст жиру 49,8 - 50,5 %, олеїнової кислоти 74,6 - 75,8 %, білку 16,5%. Вихід олії 1315 - 1461 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи, генетично стійкий до гербіцидів групи ІМІ. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017048 MAC 91A

Степ, Лісостеп

Заявник: Маїсадур Семанс

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з помірною пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки широкотрикутна. Листок з помірними вушками та слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, зігнуті за довжиною, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки темний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою висока. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 31,3 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,7 ц/га, до національних стандартів 3,4 ц/га; в умовах Лісостепу 28,2 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,2 ц/га. Вміст жиру 49,2 - 49,5%, білку 16,7 - 17,5%. Вихід олії 1462 - 1670 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

06017050 MAC 92OL

Степ, Лісостеп

Заявник: Маїсадур Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослини низькі, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) плеската. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Гібрид має високий вміст олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,7 ц/га, в зоні Лісостепу 27,2 ц/га. Вміст жиру 48,1 - 49,6 %, олеїнової кислоти 84 %, білку 16,9 - 17,6 %. Вихід олії 1336 - 1433 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017051 MAC 95IP

Степ

Заявник: Маїсадур Семанс

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з помірною пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі плеската, форма верхівки загострена. Листок з помірними вушками та слабко

вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній.

Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, зігнуті за довжиною, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою низька. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 28,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,9 ц/га. Вміст жиру 50,3%, білку 17,3%. Вихід олії 1474 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017062 Маріца

Степ, Лісостеп

Заявник: Добружанський Сільськогосподарський Інститут

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена, але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природною висотою середня, галушення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 26,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,1 ц/га; в зоні Лісостепу 24,5 ц/га, гарантована прибавка 4,0 ц/га. Вміст жиру 49,3 - 49,9 %, білку 16,4 - 16,6%. Вихід олії 1319 - 1544 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017095 MAC 98M

Лісостеп

Заявник: Маїсадур Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми, довгі. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галушення відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування в зоні Лісостепу становила 29,2 ц/га, гарантована прибавка 8,7 ц/га. Вміст жиру 49,0%, білку 16,7 %. Вихід олії 1324 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017097 MAC 91IP

Степ, Лісостеп