

вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній.

Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, зігнуті за довжиною, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою низька. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 28,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,9 ц/га. Вміст жиру 50,3%, білку 17,3%. Вихід олії 1474 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017062 Маріца

Заявник: Дobreжанський Сільськогосподарський Інститут

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та помірними вушками. Форма поперекового розрізу листка слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки-чітко видовжена, але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природною висотою середня, галузнення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янок слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 26,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,1 ц/га; в зоні Лісостепу 24,5 ц/га, гарантована прибавка 4,0 ц/га. Вміст жиру 49,3 - 49,9 %, білку 16,4 - 16,6%. Вихід олії 1319 - 1544 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017095 MAC 98M

Заявник: Маїсадур Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та вушками. Форма поперекового розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми, довгі. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галузнення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янок слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування в зоні Лісостепу становила 29,2 ц/га, гарантована прибавка 8,7 ц/га. Вміст жиру 49,0%, білку 16,7 %. Вихід олії 1324 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017097 MAC 91P

Степ, Лісостеп

Степ, Лісостеп