

вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній.

Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, зігнуті за довжиною, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою низька. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 28,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,9 ц/га. Вміст жиру 50,3%, білку 17,3%. Вихід олії 1474 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017062 Маріца

Степ, Лісостеп

Заявник: Добружанський Сільськогосподарський Інститут

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки щільні, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена, але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природною висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 26,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,1 ц/га; в зоні Лісостепу 24,5 ц/га, гарантована прибавка 4,0 ц/га. Вміст жиру 49,3 - 49,9 %, білку 16,4 - 16,6%. Вихід олії 1319 - 1544 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017095 МАС 98М

Лісостеп

Заявник: Маїсадур Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми, довгі. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування в зоні Лісостепу становила 29,2 ц/га, гарантована прибавка 8,7 ц/га. Вміст жиру 49,0%, білку 16,7 %. Вихід олії 1324 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017097 МАС 91IP

Степ, Лісостеп

Заявник: Маїсадур Семанс

Антоціанове забарвлення гіпокотилю відсутнє. Листок середнього розміру з помірними пухирчатістю, зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжені але й чітко округлі, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослини за природньою висотою низькі. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькоюйцеподібної форми, за основним кольором сіра, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 26, 2 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,8 ц/га; в зоні Лісостепу 28,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 4,1 ц/га. Вміст жиру 51,2 - 52,3%, білку 15,6 - 16,0%. Вихід олії 1464 - 1516 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017098 МАС 96ОЛ

Степ, Лісостеп

Заявник: Маїсадур Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру із слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослини низькі, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) плеската. Сім'янка середнього розміру, вузькоюйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,8 ц/га, в зоні Лісостепу 26,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 6,4 ц/га. Вміст жиру 49,7%, білку 16,1 %. Вихід олії 1297 - 1350 ц/га. Гібрид відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017026 МН6320

Степ, Лісостеп

Заявник: Сингента Кроп Протекшн АГ

Гіпокотиль з сильним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчатістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки ширококутна. Листок з помірними вушками та слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) дуже сильна. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, зігнуті за довжиною, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природньою висотою середня. Галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик за розміром середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькоюйцеподібна, чорна з сірими смужками.