

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

® **06018009 Анастасія**

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Приватне підприємство "Наукова селекційно-насінницька фірма "Соєвий вік"

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини сорту з проміжним типом росту, відсутнім або дуже слабким ступенем завивання, мають висоту від середньої до високої (91- 110 см), сіре опушення, напівстиснуту форму куща.

Час початку цвітіння від дуже раннього до раннього, а час досягання - ранній з наявним опаданням листя.

Стебло нефасційоване, середньої товщини (7,0-12,0 мм), має середню кількість вузлів (10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, ланцетної форми із загостреною формою верхівки.

Квітка має фіолетове забарвлення віночка. Біб світлого кольору, серповидної форми та має середню довжину (40,1-50,0 мм), вузький (менше 9 мм).

Насінина овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та має жовтого кольору рубчик лінійної форми з відсутнім вічком.

Насіння за масою 1000 зерен – дрібне (менше 130 г).

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 20,4 ц/га, Лісостепу – 24,4 ц/га, Полісся – 20,1 ц/га з вмістом жиру відповідно 20,8; 21,2 і 22,4%, білку – 38,5; 37,4 і 34,8%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 10,4-15,1 см. Маса 1000 насінин – 120,6-136,6 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

07018005 Богеміанс

Степ, Полісся

Заявник: Семенсес Прогрейн ІНК

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотіля, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середньоранній час початку цвітіння та ранній досягання з відсутнім опаданням листя.

□ Стебло з малою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

□ Листок – помірно-зеленого кольору та з відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має заокруглену форму верхівки.

□ Забарвлення квітки – фіолетове.

□ Біб середньої довжини та вузький, прямої форми. Забарвлення бобу – світло-коричнєве.

□ Насінина – округло-випуклої форми з основним світло-коричневим забарвленням оболонки. Рубчик насінина жовтого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

□ Маса 1000 зерен – середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2007-209) у зоні Степу – 20,3 ц/га, Поліссі – 19,9 ц/га. Вміст жиру відповідно – 20,9; 22,1%.

Вміст білку відповідно – 38,2; 35,2%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 10-13 см. Стійкий до посухи, осипання та вилягання.

® **06018012 Вінні**

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Висота рослин знаходиться в межах від низької до середньої (51-70 см). Рослини мають детермінантний тип росту з жовто-коричневим опушенням, ступенем завивання стебла відсутнім або дуже слабким, напівстиснуту форму куща, час і початку цвітіння, і час досягання знаходяться в межах від дуже раннього до раннього з наявним опаданням листя.

Стебло нефасційоване, тонке (менше 7,0 мм), має середню кількість вузлів (10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, овальний із загосреною формою верхівки.

Квітка має фіолетове забарвлення віночка. Біб світло-коричневого кольору, має серповидну форму, середній за довжиною (40,1-50,0 мм) і вузький (менше 9,0 мм).

Насінина овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та темно-коричневим забарвленням рубчика.

Рубчик клиновидної форми без вічка на ньому та з малюнком (смужками) навколо нього.

Маса 1000 зерен – середня (131- 190 г).

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 18,5 ц/га, Лісостепу – 22,0 ц/га, з вмістом жиру відповідно 19,1 і 21,0%, білку – 40,5 і 39,2%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 10,8-12,9 см. Маса 1000 насінин – 138,6-141,7 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

Степ

® 06018013 Вежа

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Гіпокотиль у рослин сорту з відсутнім антоціановим забарвленням. Висота рослин сорту - середня (71-90 см). Рослини проміжного типу росту, з сірим опушенням, ступенем завивання стебла відсутнім або дуже слабким з напівстиснутою формою куща. Час і початку цвітіння, і час досягання знаходяться в межах від дуже раннього до раннього з наявним опаданням листя.

Стебло нефасційоване, середньої товщини (7,0 - 12,0 мм), має середню кількість вузлів (10-15 шт.). Листок світло- зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, клиновидний із загосреною формою верхівки.

Квітка має біле забарвлення віночка. Біб світлого кольору, має слабкозігнуту форму, середньої довжини (40,1-50,0 мм) і вузький (менше 9,0 мм).

Насінина овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та світло-коричневим забарвленням рубчика.

Рубчик лінійної форми з наявним вічком на ньому та з малюнком (смужками) навколо нього.

Маса 1000 зерен – велика (більше 190 г).

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 19,4 ц/га з вмістом жиру 20,2%, білку – 39,8%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 11,5 см. Маса 1000 насінин – 169,6 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

Степ

06018007 Георгіна

Заявник: Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотіля, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, слабе завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середній час початку цвітіння та середньопізній досягання з наявним опаданням листя.

□ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

□ Листок – помірно-зеленого кольору з помірною ступінню пухирчастості.

Середній листочок за розміром – середній, овальний та має