

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Висота рослин знаходиться в межах від низької до середньої (51-70 см). Рослини мають детермінантний тип росту з жовто-коричневим опушенням, ступенем завивання стебла відсутнім або дуже слабким, напіввистиснуту форму куща, час і початку цвітіння, і час достигання знаходяться в межах від дуже раннього до раннього з наявним опаданням листя.

Стебло нефасційоване, тонке (менше 7,0 мм), має середню кількість вузлів (10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, овальний із загосреною формою верхівки.

Квітка має фіолетове забарвлення віночка. Біб світло-коричневого кольору, має серповидну форму, середній за довжиною (40,1-50,0 мм) і вузький (менше 9,0 мм).

Насінина овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та темно-коричневим забарвленням рубчика.

Рубчик клиновидної форми без вічка на ньому та з малюнком (смужками) навколо нього.

Маса 1000 зерен – середня (131-190 г).

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 18,5 ц/га, Лісостепу – 22,0 ц/га, з вмістом жиру відповідно 19,1 і 21,0%, білку – 40,5 і 39,2%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 10,8-12,9 см. Маса 1000 насінин – 138,6-141,7 г.

Стойкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

® 06018013 Вежа

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Степ

Гіпокотиль у рослин сорту з відсутнім антоціановим забарвленням. Висота рослин сорту - середня (71-90 см). Рослини проміжного типу росту, з сірим опушенням, ступенем завивання стебла відсутнім або дуже слабким з напіввистиснутою формою куща. Час і початку цвітіння, і час достигання знаходиться в межах від дуже раннього до раннього з наявним опаданням листя.

Стебло нефасційоване, середньої товщини (7,0 - 12,0 мм), має середню кількість вузлів (10-15 шт.). Листок світло- зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, клиновидний із загосреною формою верхівки.

Квітка має біле забарвлення віночка. Біб світлого кольору, має слабкозигнуту форму, середньої довжини (40,1-50,0 мм) і вузький (менше 9,0 мм).

Насінина овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та світло-коричневим забарвленням рубчика.

Рубчик лінійної форми з наявним вічком на ньому та з малюнком (смужками) навколо нього.

Маса 1000 зерен – велика (більше 190 г).

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 19,4 ц/га з вмістом жиру 20,2%, білку – 39,8%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 11,5 см. Маса 1000 насінин – 169,6 г.

Стойкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

Степ

06018007 Георгіна

Заявник: Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотіля, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, слабе завивання стебла, напіввистиснуту форму куща, середній час початку цвітіння та середньопізній достигання з наявним опаданням листя.

□ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

□ Листок – помірно-зеленого кольору з помірно ступінню пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має