

Заявник:

Маїсадур Семанс

Антоціанове забарвлення гіпокотилю відсутнє. Листок середнього розміру з помірними пухирчатістю, зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжені але й чітко округлі, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослини за природньою висотою низькі. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькоюйцеподібною форми, за основним кольором сіра, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 26, 2 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,8 ц/га; в зоні Лісостепу 28,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 4,1 ц/га. Вміст жиру 51,2 - 52,3%, білку 15,6 - 16,0%. Вихід олії 1464 - 1516 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017098 MAC 96OL

Степ, Лісостеп

Заявник:

Маїсадур Семанс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру із слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослини низькі, галузнення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) плеската. Сім'янка середнього розміру, вузькоюйцеподібною форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,8 ц/га, в зоні Лісостепу 26,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 6,4 ц/га. Вміст жиру 49,7%, білку 16,7 %. Вихід олії 1297 - 1350 ц/га. Гібрид відносно стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017026 MH6320

Степ, Лісостеп

Заявник:

Сингента Кроп Протекшн АГ

Гіпокотиль з сильним антоціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчатістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки ширококутна. Листок з помірними вушками та слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) дуже сильна. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, зігнуті за довжиною, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природньою висотою середня. Галузнення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик за розміром середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькоюйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 28,8 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,9 ц/га, до національних стандартів 6,0 ц/га; в зоні Лісостепу 25,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,4 ц/га. Вміст жиру 49,4 - 49,4%, білку 16,0 - 16,5%. Вихід олії 1284 - 1554 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017071 МН 7268

Степ, Лісостеп

Заявник: Сингента Кроп Протекшн АГ

Гіпокотиль з сильним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки широкотрикутна. Листок з помірними вушками та слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) дуже сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 26,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,6 ц/га; в умовах Лісостепу 27,7 ц/га, гарантована прибавка 2,4 ц/га. Вміст жиру 50,0 - 50,6%, білку 15,6 - 16,4 %. Вихід олії 1274 - 1477 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

07017006 МН 6219

Степ, Лісостеп

Заявник: Сингента Кроп Протекшн АГ

Гіпокотиль з сильним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки широкотрикутна. Листок з помірними вушками та слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) дуже сильна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою висока. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 29,3 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,3 ц/га, до національних стандартів 4,4 ц/га; в умовах Лісостепу 29,3 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 0,5 ц/га, до національних стандартів 4,0 ц/га. Вміст жиру 49,8 - 50,0 %, білку 16,2 - 16,7%. Вихід олії 1503 - 1593 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

07017047 НС-Х-6059

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу - слабка. Листок середнього розміру з відсутньою або дуже слабкою