

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 28,8 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,9 ц/га, до національних стандартів 6,0 ц/га; в зоні Лісостепу 25,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,4 ц/га. Вміст жиру 49,4 - 49,4%, білку 16,0 - 16,5%. Вихід олії 1284 - 1554 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017071 MN 7268

Степ, Лісостеп

Заявник: Сингента Кроп Протекшн АГ

Гіпокотиль з сильним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки широкотрикутна. Листок з помірними вушками та слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) дуже сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення кошика відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 26,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,6 ц/га; в умовах Лісостепу 27,7 ц/га, гарантована прибавка 2,4 ц/га. Вміст жиру 50,0 - 50,6%, білку 15,6 - 16,4 %. Вихід олії 1274 - 1477 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

07017006 MN 6219

Степ, Лісостеп

Заявник: Сингента Кроп Протекшн АГ

Гіпокотиль з сильним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки широкотрикутна. Листок з помірними вушками та слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) дуже сильна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення кошика відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою висока. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 29,3 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,3 ц/га, до національних стандартів 4,4 ц/га; в умовах Лісостепу 29,3 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 0,5 ц/га, до національних стандартів 4,0 ц/га. Вміст жиру 49,8 - 50,0 %, білку 16,2 - 16,7%. Вихід олії 1503 - 1593 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

07017047 HS-X-6059

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овоочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу - слабка. Листок середнього розміру з відсутньою або дуже слабкою