

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 28,8 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,9 ц/га, до національних стандартів 6,0 ц/га; в зоні Лісостепу 25,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,4 ц/га. Вміст жиру 49,4 - 49,4%, білку 16,0 - 16,5%. Вихід олії 1284 - 1554 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017071 МН 7268

Степ, Лісостеп

Заявник: Сингента Кроп Протекшн АГ

Гіпокотиль з сильним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки широкотрикутна. Листок з помірними вушками та слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) дуже сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 26,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,6 ц/га; в умовах Лісостепу 27,7 ц/га, гарантована прибавка 2,4 ц/га. Вміст жиру 50,0 - 50,6%, білку 15,6 - 16,4 %. Вихід олії 1274 - 1477 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

07017006 МН 6219

Степ, Лісостеп

Заявник: Сингента Кроп Протекшн АГ

Гіпокотиль з сильним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки широкотрикутна. Листок з помірними вушками та слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) дуже сильна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою висока. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 29,3 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,3 ц/га, до національних стандартів 4,4 ц/га; в умовах Лісостепу 29,3 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 0,5 ц/га, до національних стандартів 4,0 ц/га. Вміст жиру 49,8 - 50,0 %, білку 16,2 - 16,7%. Вихід олії 1503 - 1593 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

07017047 НС-Х-6059

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу - слабка. Листок середнього розміру з відсутньою або дуже слабкою

пухирчастістю, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина середньої висоти, галушення відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 28,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 4,1 ц/га; в умовах Лісостепу 28,2 ц/га, гарантована прибавка 4,0 ц/га. Вміст жиру 50,3 - 52,2 %, білку 15,6 - 15,8 %. Вихід олії 1430 - 1533 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017048 HC-X-6043

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу - помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, чітко округлені, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина середньої висоти, галушення відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 25,9 ц/га, в зоні Лісостепу 25,8 ц/га, гарантована прибавка 5,3 ц/га. Вміст жиру 49,2 %, білку 16,7 - 17,0 %. Вихід олії 1322 - 1393 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017049 HC-X-6044

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу - слабка. Листок малого розміру з відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю, зубці помірні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки щільні, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та довгі. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена але і чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина низька, галушення відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - маленький, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 25,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,7 ц/га; в зоні Лісостепу 24,5 ц/га, гарантована прибавка 0,3 ц/га. Вміст жиру 48,9 %, білку 16,9 %, вихід олії 1273 - 1391 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. За період випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.