

пухирчастістю, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина середньої висоти, галузнення відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцевидної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 28,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 4,1 ц/га; в умовах Лісостепу 28,2 ц/га, гарантована прибавка 4,0 ц/га. Вміст жиру 50,3 - 52,2 %, білку 15,6 - 15,8 %. Вихід олії 1430 - 1533 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

Степ, Лісостеп

07017048 HC-X-6043

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу - помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, чітко округлені, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина середньої висоти, галузнення відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцевидної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 25,9 ц/га, в зоні Лісостепу 25,8 ц/га, гарантована прибавка 5,3 ц/га. Вміст жиру 49,2 %, білку 16,7 - 17,0 %. Вихід олії 1322 - 1393 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. За період випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

Степ, Лісостеп

07017049 HC-X-6044

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу - слабка. Листок малого розміру з відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю, зубці помірні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки щільні, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та довгі. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена але і чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина низька, галузнення відсутнє. Положення кошика - напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика - маленький, форма кошика (з боку сім'янок) - сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцевидної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 25,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,7 ц/га; в зоні Лісостепу 24,5 ц/га, гарантована прибавка 0,3 ц/га. Вміст жиру 48,9 %, білку 16,9 %, вихід олії 1273 - 1391 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. За період випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.