

Заявник: Інститут польовництва та овоочівництва, м. Нові Сади

Антоціанове забарвлення гіпокотилу відсутнє. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та великими вухками. Форма попережного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квіткі щільні, помірної-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квіткі оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки-чітко видовжена, але й чітко округла, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природною висотою середня, галузнення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика маленький, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,9 ц/га, в зоні Лісостепу 24,9 ц/га. Вміст жиру 50,2 - 51,0 %, білку 15,9 - 16,2 %. Вихід олії 1343 - 1536 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

### 06017062 НК Октава

### Лісостеп

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок середній, помірною зеленою кольору, слабкою пухирчатістю та помірними зубцями. Форма листка у попережному розрізі слабко увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вухками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квіткі середньої щільності, плоскі, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубочасті квіткі оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Лісостепу становила 32,8 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,5 ц/га, до національного стандарту 3,1 ц/га. Вміст жиру 50,0%, білку 16,1%. Вихід олії 1499 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

### 06017064 НК Дуета

### Лісостеп

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок середній, помірною зеленою кольору, слабкою пухирчатістю та дрібними зубцями. Форма листка у попережному розрізі слабко увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вухками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квіткі середньої щільності, зігнуті за довжиною, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубочасті квіткі жовті. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик маленький, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.