

Середньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Лісостепу становила 29,9 ц/га, гарантована прибавка до національного стандарту 0,2 ц/га. Вміст жиру 50,9%, білку 16,4%. Вихід олії 1504 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи. Ураження хворобами і пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

### 06017065 НК Неома

Степ, Лісостеп

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору, слабкою пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки нещільні, зігнуті за довжиною, вузько-яйцевидні, короткі, помірно-жовті. Трубчасті квітки жовті. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик маленький, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькоюяцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 30,8 ц/га, в зоні Лісостепу 29,4 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,6%, білку 16,7 - 17,5%. Вихід олії 1477 - 1588 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

### 06017067 НК Армоні

Степ, Лісостеп

Заявник: Сінгента Сідз С.А.С.

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору, відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки загострена. Листок з великими вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, зігнуті за довжиною, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки жовті. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькоюяцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 33,9 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 3,5 ц/га, до національного стандарту 2,8 ц/га; в умовах Лісостепу 30,9 ц/га, гарантована прибавка до національного стандарту 1,2 ц/га. Вміст жиру 50,4 - 51,8%, білку 15,6 - 16,4%. Вихід олії 1670 - 1864 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання та посухи. За час випробування ураження хворобами і пошкодження шкідниками незначне.

### ® 06017074 НС Сумо 2017

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з великими вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого.

Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькоюяцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 26,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,4 ц/га; в зоні Лісостепу 28,0 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,7 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,7 %, білку 16,4 - 17,0 %. Вихід олії 1492 - 1514 кг/га. Гібрид стійкий до гербіцидів групи ІМІ, відносно стійкий проти вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

### ® 06017077 НС Сумо 2019

Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з помірною пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з великими вушками та слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькоюяцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Лісостепу становила 29,0 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,0 ц/га, до національних стандартів 3,7 ц/га. Вміст жиру 49,5%, білку 15,5%. Вихід олії 1429 кг/га. Гібрид стійкий до гербіцидів групи ІМІ, відносно стійкий проти вилягання та посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

### ® 06017078 НС Сумо 2018

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки загострена. Листок з великими вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою висока. Положення кошика обернене донизу разом із стеблом. Кошик середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькоюяцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 28,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 3,5 ц/га; в зоні Лісостепу 27,2 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,9 ц/га. Вміст жиру 49,8 -