

Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика обернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 26,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,4 ц/га; в зоні Лісостепу 28,0 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,7 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,7 %, білку 16,4 - 17,0 %. Вихід олії 1492 - 1514 кг/га. Гібрид стійкий до гербіцидів групи ІМІ, відносно стійкий проти вилягання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

® 06017077 НС Сумо 2019

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Лісостеп

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з помірно пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з великими вушками та слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння пізній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Лісостепу становила 29,0 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,0 ц/га, до національних стандартів 3,7 ц/га. Вміст жиру 49,5%, білку 15,5%. Вихід олії 1429 кг/га. Гібрид стійкий до гербіцидів групи ІМІ, відносно стійкий проти вилягання та посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

® 06017078 НС Сумо 2018

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Степ, Лісостеп

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки загострена. Листок з великими вушками та відсутніми або слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою висока. Положення кошика обернене донизу разом із стеблом. Кошик середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 28,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 3,5 ц/га; в зоні Лісостепу 27,2 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,9 ц/га. Вміст жиру 49,8 -