

злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,7 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,0 ц/га; в зоні Лісостепу 28,6 ц/га, гарантована прибавка 8,1 ц/га. Вміст жиру 49,6 - 50,5 %, білку 16,5%. Вихід олії 1452 - 1505 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

05017089 Оллімі

Заявник: Р2Н

Степ, Лісостеп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу сильна. Листок середнього розміру з помірними пухирчатістю та вушками, грубими зубцями. Форма поперекового розрізу листка слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галузнення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із сильним викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором сіра, смугастість на краях та між краями сім'янки - відсутня.

Ранньостиглий високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в умовах Степу 25,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,6 ц/га; в умовах Лісостепу 25,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,6 ц/га. Вміст жиру 49,5 - 50,0%, олеїнової кислоти 77,4%, білку 16,2 - 16,6%. Вихід олії 1350 - 1423 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання, посухи. За період випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне. Стійкий до гербіцидів групи ІМІ.

06017076 Оливер

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Степ, Лісостеп

Гіпокотиль з середнім аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчатістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперековому розрізі слабо увігнута та формою верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Язичкові квітки середньої щільності, широко-яйцевидні, плоскі, короткі, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик за природною висотою висока. Галузнення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик за розміром середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, середня, чорна з сірими смужками. Скоростиглий високоолеїновий гібрид. Середня урожайність становила в зоні Степу 27,8 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,2 ц/га, національних стандартів 5,0 ц/га; в зоні Лісостепу 27,2 ц/га - гарантована прибавка до національних стандартів 1,8 ц/га. Вміст жиру 50,1 - 50,6%, олеїнової кислоти 82%, білку 16,4 - 17,0%. Вихід олії 1344 - 1485 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий проти посухи. За період випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017088 Обрая КС

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Степ

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок за розміром великий із слабкою пухирчатістю, помірними зубцями