

та вушками. Форма поперечного розрізу листка слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірної довжини, вузько-яйцевидної форми, за довжиною довгі. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, верхівка довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за висотою низька, галузження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 29,7 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,0 ц/га. Вміст жиру 50,7 %, білку 16,7 %. Вихід олії 1577 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017003 Політ 2

Заявник: Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу помірна. Листок середнього розміру з помірними пухирчатістю, зубцями та вушками. Форма поперечного розрізу листка слабо-увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірної довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галузження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила: в зоні Степу 24,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,6 ц/га; в зоні Лісостепу 27,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,4 ц/га. Вміст жиру 49,2 - 50,5 %, білку 16,0 - 16,4 %. Вихід олії 1311 - 1413 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, відносно стійкий проти посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

® 07017025 Параізо 102 CL

Заявник: Заатен-Уніон Румунія Срл.

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу дуже слабка. Листок середнього розміру з слабою пухирчатістю, грубими зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірної довжини, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена, але й чітко округла, верхівка довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природною висотою середня, галузження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 26,6 ц/га, в зоні Лісостепу 26,6 ц/га. Вміст жиру 49,8 - 50,0 %, білку 16,7 %. Вихід олії 1387 - 1876 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; генетично стійкий до гербіцидів групи ІМІ. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017010 Прімі

Степ, Лісостеп

Степ, Лісостеп

Степ, Лісостеп