

та вушками. Форма поперечного розрізу листка слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми, за довжиною довгі. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, верхівка довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за висотою низька, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 29,7 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,0 ц/га. Вміст жиру 50,7 %, білку 16,7 %. Вихід олії 1577 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017003 Політ 2

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру з помірними пухирчатістю, зубцями та вушками. Форма поперечного розрізу листка слабо-увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена але й чітко округла, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки відсутня.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила: в зоні Степу 24,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,6 ц/га; в зоні Лісостепу 27,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,4 ц/га. Вміст жиру 49,2 - 50,5%, білку 16,0 - 16,4%. Вихід олії 1311 - 1413 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, відносно стійкий проти посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

® 07017025 Параізо 102 CL

Степ, Лісостеп

Заявник: Заатен-Унион Румунія Срл.

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю дуже слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, грубими зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена, але й чітко округла, верхівка довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 26,6 ц/га, в зоні Лісостепу 26,6 ц/га. Вміст жиру 49,8 - 50,0 %, білку 16,7 %. Вихід олії 1387 - 1876 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи; генетично стійкий до гербіцидів групи ІМІ. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017010 Прімі

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору слабкою пухирчастістю та дрібними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі сильно увігнута, форма верхівки загострена. Листок з дуже великими вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькоюйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Скоростиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 27,1 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,5 ц/га, до національних стандартів 4,3 ц/га; в умовах Лісостепу 27,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,9 ц/га. Вміст жиру 48,0 - 48,2 %, білку 16,5 - 17,2%. Вихід олії 1197 - 1560 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи, ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне. Стійкий до гербіцидів групи ІМІ.

06017023 ПР64Г47

Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми, довгі. Трубчасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена але й чітко округла, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькоюйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 28,2 ц/га, в зоні Лісостепу 27, 5 ц/га. Вміст жиру 48,8 - 49,1 %, олеїнової кислоти 86 %, білку 17,0 - 17,5 %. Вихід олії 1403 - 1410 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017074 ПАП - 255

Степ

Заявник: Палента технологіс

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору, слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки широкотрикутна. Листок з великими вушками та слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, плоскі, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькоюйцеподібна, чорна з сірими смужками.