

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 29,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,2 ц/га. Вміст жиру 48,0%, білку 17,8%. Вихід олії 1378 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий проти посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

### 07017075 ПАЛ - 175

Степ

Заявник: Палента технолоджіс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжена, округла, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування в зоні Степу становила 17,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 3,0 ц/га. Вміст жиру 49,1 %, білку 16,7 %. Вихід олії 1432 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

### 06017026 ПР64Ф66

Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром зі слабкою пухирчатістю. Зубці грубі. У поперечному розрізі форма листка плеската, верхівка загострена, крила листка слабко виражені, помірна наявність вушок. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см ) слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько- яйцеподібної форми, за положенням плоскі, короткі за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко округлої та видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини середньої висоти, з відсутнім галуженням. Кошик напівобернений донизу з прямим стеблом, за розміром середній, форма з боку сім'янок сильно випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має дуже сильну смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість дуже сильна.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 30,6 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,6 ц/га, до національних стандартів 5,7 ц/га; в умовах Лісостепу 33,4 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 4,6 ц/га, до національних стандартів 8,1 ц/га. Вміст жиру 48,7 - 49,3 %, білку 16,8 - 17,3 %. Вихід олії 1404 - 1634 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

### 07017076 ПАЛ - 035

Степ, Лісостеп

Заявник: Палента технолоджіс

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із помірною

пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабо увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабо виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см ) слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору. Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Висота рослин середня, з відсутнім галуженням. Кошик напівобернений донизу разом із прямим стеблом, за розміром середній, форма з боку сім'янок сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,5 ц/га; в зоні Лісостепу 24,3 ц/га. Вміст жиру 50,2 - 50,4 %, білку 16,3 - 16,5 %. Вихід олії 1300 - 1423 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, посухи, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

### 06017027 ПР64А15

Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмБХ

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із помірною пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка плеската, верхівка від широкотрикутної до загостреної, крила листка відсутні або слабо виражені, помірна наявність вушок. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см ) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням зігнуті за довжиною, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко округлої та видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини середні за висотою, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром середній, форма з боку сім'янок сильно випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість слабка.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 33,3 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 3,5 ц/га, до національних стандартів 5,4 ц/га; в умовах Лісостепу 31,4 ц/га, гарантована прибавка відповідно 1,7 і 3,3 ц/га. Вміст жиру 52,2 %, білку 15,2 - 15,9 %. Вихід олії 1450 - 1786 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

### 07017077 ПАЛ - 083

Степ, Лісостеп

Заявник: Палента технолоджіс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру з відсутньою або дуже слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та за довжиною довгі. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка,