

пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабо увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабо виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору. Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Висота рослин середня, з відсутнім галушенням. Кошик напівобернений донизу разом із прямим стеблом, за розміром середній, форма з боку сім'янок сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,5 ц/га; в зоні Лісостепу 24,3 ц/га. Вміст жиру 50,2 - 50,4 %, білку 16,3 - 16,5 %. Вихід олії 1300 - 1423 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, посухи, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

06017027 PR64A15

Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із помірно пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка плеската, верхівка від широкотрикутної до загостреної, крила листка відсутні або слабо виражені, помірна наявність вушок. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням зігнуті за довжиною, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко округлої та видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини середні за висотою, з відсутнім галушенням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром середній, форма з боку сім'янок сильно випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість слабка.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 33,3 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 3,5 ц/га, до національних стандартів 5,4 ц/га; в умовах Лісостепу 31,4 ц/га, гарантована прибавка відповідно 1,7 і 3,3 ц/га. Вміст жиру 52,2 %, білку 15,2 - 15,9 %. Вихід олії 1450 - 1786 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017077 ПАЛ - 083

Степ, Лісостеп

Заявник: Палента технолоджіс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу помірна. Листок середнього розміру з відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю, дрібними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та за довжиною довгі. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галушення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка,

смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,3 ц/га; в зоні Лісостепу 23,5 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 3,0 ц/га. Вміст жиру 49,9 %, олеїнової кислоти 86,1 %, білку 16,6 %. Вихід олії 1267 - 1430 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017078 ПАЛ - 0917

Степ

Заявник: Патента технологів

Листок середній, помірного зеленого кольору, помірно пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі сильно увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками тупий. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, плоскі, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика нахилене. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в умовах Степу 29,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,5 ц/га. Вміст жиру 48,0%, білку 17,7%. Вихід олії 1242 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

06017029 ПР64Е71

Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Семена Холдінг ГезмбХ

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі плеската, форма верхівки загострена. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик за розміром середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньоранній гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 32,9 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 3,3 ц/га, до національних стандартів 5,0 ц/га; в зоні Лісостепу 31,3 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,6 ц/га, до національних стандартів 3,2 ц/га. Вміст жиру 49,2 - 50,0%, білку 16,1 - 16,9%. Вихід олії 1324 - 1498 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017016 ПР63Г40

Лісостеп

Заявник: Піонер Хай-Бред Світцерленд СА

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, помірними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній.