

шкідниками за період випробування незначне.

07017080 ПАЛ - 0117

Заявник: Палента технолоджіс

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, дрібними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природньою висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність в зоні Степу за час випробування становила 25,7 ц/га. Вміст жиру 50,1 %, білку 16,2 %. Вихід олії 1558 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

Степ

07017018 ПР64Г46

Заявник: Піонер Хай-Бред Світцерленд СА

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із слабкою пухирчатістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка загострена, крила листка слабко виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння дуже ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору. Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, але й чітко округлі, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Висота рослин середня, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу разом із прямим стеблом, за розміром маленький, форма з боку сім'янок злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцевидної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість слабка.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування в зоні Степу становила 28,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,7 ц/га. Вміст жиру 49,1 %, білку 16,6 %. Вихід олії 1672 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

Степ

07017019 ПР63К83

Заявник: Піонер Хай-Бред Світцерленд СА

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію сильна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчатістю, грубими зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка слабко увігнута. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжені, але й чітко округлі, верхівка довга, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцевидної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або

Степ

дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку випробування. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 32,0 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,4 ц/га, до національних стандартів 4,1 ц/га. Вміст жиру 52,2 %, білку 16,1 %. Вихід олії 1580 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017020 ПР64Ф50

Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Хай-Бред Свіццерленд СА

Антоціанове забарвлення гіпокотилю відсутнє. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із слабкою пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабо увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабо виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору. Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, але й чітко округлі, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Висота рослини середня, з відсутнім галуженням. Кошик напівобернений донизу разом з прямим стеблом, за розміром великий, форма з боку сім'янок сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку випробування. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу та Лісостепу 30,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 3,2 - 5,0 ц/га. Вміст жиру 49,1 - 50,0 %, білку 16,5 %. Вихід олії 1546 - 1660 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017036 Робія КС

Степ, Лісостеп

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю слабка. Листок середнього розміру з дуже слабкою або відсутньою пухирчатістю, помірними зубцями та вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки-чітко видовжені, але й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 32,2 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,9 ц/га, до національних стандартів 1,1 ц/га; в умовах Лісостепу 29,3 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,5 %, білку 17,2 - 17,4 %. Вихід олії 1514 - 1674 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 06017038 Романс

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору відсутньою або дуже слабкою