

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Висота рослин знаходиться в межах від низької до середньої (51-70 см). Рослини мають детермінантний тип росту з жовто-коричневим опушенням, ступенем завивання стебла відсутнім або дуже слабким, напіввстиснуту форму куща, час і початку цвітіння, і час досягання знаходяться в межах від дуже раннього до раннього з наявним опаданням листя.

Стебло нефасційоване, тонке (менше 7,0 мм), має середню кількість вузлів (10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, овальний із загосреною формою верхівки.

Квітка має фіолетове забарвлення віночка. Біб світло-коричневого кольору, має серповидну форму, середній за довжиною (40,1-50,0 мм) і вузький (менше 9,0 мм).

Насінина овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та темно-коричневим забарвленням рубчика.

Рубчик клиновидної форми без вічка на ньому та з малюнком (смужками) навколо нього.

Маса 1000 зерен – середня (131- 190 г).

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 18,5 ц/га, Лісостепу – 22,0 ц/га, з вмістом жиру відповідно 19,1 і 21,0%, білку – 40,5 і 39,2%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 10,8-12,9 см. Маса 1000 насінин – 138,6-141,7 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

Степ

### ® 06018013 Вежа

Заявник: Інститут кормів Української академії аграрних наук

Гіпокотиль у рослин сорту з відсутнім антоціановим забарвленням. Висота рослин сорту - середня (71-90 см). Рослини проміжного типу росту, з сірим опушенням, ступенем завивання стебла відсутнім або дуже слабким з напіввстиснутою формою куща. Час і початку цвітіння, і час досягання знаходиться в межах від дуже раннього до раннього з наявним опаданням листя.

Стебло нефасційоване, середньої товщини (7,0 - 12,0 мм), має середню кількість вузлів (10-15 шт.). Листок світло- зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, клиновидний із загосреною формою верхівки.

Квітка має біле забарвлення віночка. Біб світлого кольору, має слабкозігнуту форму, середньої довжини (40,1-50,0 мм) і вузький (менше 9,0 мм).

Насінина овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та світло-коричневим забарвленням рубчика.

Рубчик лінійної форми з наявним вічком на ньому та з малюнком (смужками) навколо нього.

Маса 1000 зерен – велика (більше 190 г).

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 19,4 ц/га з вмістом жиру 20,2%, білку – 39,8%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 11,5 см. Маса 1000 насінин – 169,6 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

Степ

### 06018007 Георгіна

Заявник: Буковинський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотіля, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, слабе завивання стебла, напіввстиснуту форму куща, середній час початку цвітіння та середньопізній досягання з наявним опаданням листя.

□ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

□ Листок – помірно-зеленого кольору з помірною ступінню пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має

заокруглену форму верхівки.

Забарвлення квітки – біле.

Біб середньої довжини, вузький за шириною, має слабкозігнуту форму верхівки. Забарвлення бобу – коричневе.

Насінина – овальної форми з основним жовто-зеленим забарвленням оболонки. Рубчик насінини чорного кольору, овальної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

Маса 1000 зерен – середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 18,1 ц/га з вмістом жиру 18,4%, білку – 42,9%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 13,5 см.

Стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами, середньостійкий до посухи.

### 07018015 Десна

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут сої"

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотилля, жовто-коричневим опушенням, з параметрами висоти від низької до середньої, мають проміжний тип росту, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, ранні час початку цвітіння та середньоранній достигання з наявним опаданням листя.

Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

Листок – помірного зеленого кольору та з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має загострену форму верхівки.

Забарвлення квітки – фіолетове.

Біб середньої довжини та вузький, слабкозігнутої форми. Забарвлення бобу – світло-коричневе.

Насінина – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини також жовтого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

Маса 1000 зерен – середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,2 ц/га, Лісостепу – 21,8 ц/га, Полісся – 21,8 ц/га. Вміст жиру відповідно – 20,7; 21,0; 21,2%. Вміст білку відповідно – 39,9; 38,8; 37,3%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 9-12 см. Маса 1000 насінин – 147,5-189,5 г.

Стійкий до вилягання, осипання та посухи.

### ® 06018010 Данко

Степ

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини сорту мають висоту від середньої до високої (91-110 см), проміжний тип росту та жовто-коричневе опушення, слабкий ступінь завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середньо-ранній час початку і цвітіння, і достигання з наявним опаданням листя.

Стебло нефасційоване, тонке (менше 7,0 мм), має середню кількість вузлів (10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, овальної форми із загостреною формою верхівки.

Квітка має фіолетове забарвлення віночка. Біб світло-коричневого кольору, має слабкозігнуту форму, середні показники довжини (40,1-50,0 мм) і вузький (менше 9,0 мм).

Насінина овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та частково чорним забарвленням рубчика.

Рубчик лінійної форми з наявним вічком та відсутнім малюнком біля нього.