

заокруглену форму верхівки.

- ☐ Забарвлення квітки – біле.
- ☐ Біб середньої довжини, вузький за шириною, має слабкозигнуту форму верхівки. Забарвлення бобу – коричневе.
- ☐ Насіння – овальної форми з основним жовто-зеленим забарвленням оболонки. Рубчик насіння чорного кольору, овальної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.
- ☐ Маса 1000 зерен – середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 18,1 ц/га з вмістом жиру 18,4%, білку – 42,9%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 13,5 см.

Стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами, середньостійкий до посухи.

07018015 Десна

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут сої"

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотила, жовто-коричневим опушенням, з параметрами висоти від низької до середньої, мають проміжний тип росту, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, ранні час початку цвітіння та середньоранній дозрівання з наявним опаданням листя.

- ☐ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.
- ☐ Листок – помірного зеленого кольору та з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має загострену форму верхівки.
- ☐ Забарвлення квітки – фіолетове.
- ☐ Біб середньої довжини та вузький, слабкозигнутої форми. Забарвлення бобу – світло-коричневе.
- ☐ Насіння – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насіння також жовтого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.
- ☐ Маса 1000 зерен – середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,2 ц/га, Лісостепу – 21,8 ц/га, Полісся – 21,8 ц/га. Вміст жиру

відповідно – 20,7; 21,0; 21,2%. Вміст білку відповідно – 39,9; 38,8; 37,3%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 9-12 см. Маса 1000 насінин – 147,5-189,5 г.

Стійкий до вилягання, осипання та посухи.

® 06018010 Данко

Степ

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насінництва та сортовивчення Української академії аграрних наук

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини сорту мають висоту від середньої до високої (91-110 см), проміжний тип росту та жовто-коричневе опушенням, слабкий ступінь завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середньоранній час початку і цвітіння, і дозрівання з наявним опаданням листя.

Стебло нефасційоване, тонке (менше 7,0 мм), має середню кількість вузлів (10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, овальної форми із загостреною формою верхівки.

Квітка має фіолетове забарвлення віночка. Біб світло-коричневого кольору, має слабкозигнуту форму, середні показники довжини (40,1-50,0 мм) і вузький (менше 9,0 мм).

Насіння овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та частково чорним забарвленням рубчика.

Рубчик лінійної форми з наявним вічком та відсутнім малюнком біля нього.