

дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку випробування. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 32,0 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,4 ц/га, до національних стандартів 4,1 ц/га. Вміст жиру 52,2 %, білку 16,1 %. Вихід олії 1580 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017020 ПР64Ф50

Заявник: Піонер Хай-Бред Світсерленд СА

Степ, Лісостеп

Антоціанове забарвлення гіпокотилу відсутнє. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із слабкою пухирчатістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабо увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабо виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору. Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, але й чітко округлі, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Висота рослини середня, з відсутнім галузненням. Кошик напівобернений донизу разом з прямим стеблом, за розміром великий, форма з боку сім'янок сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, середня чорного кольору. Мас слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку випробування. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу та Лісостепу 30,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 3,2 - 5,0 ц/га. Вміст жиру 49,1 - 50,0 %, білку 16,5 %. Вихід олії 1546 - 1660 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017036 Робія КС

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Степ, Лісостеп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру з дуже слабкою або відсутньою пухирчатістю, помірними зубцями та вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки-чітко видовжені, але й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галузнення відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 32,2 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,9 ц/га, до національних стандартів 1,1 ц/га; в умовах Лісостепу 29,3 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,5 %, білку 17,2 - 17,4 %. Вихід олії 1514 - 1674 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 06017038 Романс

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Степ, Лісостеп

Гіпокотиль з помірним антоціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору відсутньою або дуже слабкою