

дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку випробування. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 32,0 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 2,4 ц/га, до національних стандартів 4,1 ц/га. Вміст жиру 52,2 %, білку 16,1 %. Вихід олії 1580 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017020 ПР64Ф50

Степ, Лісостеп

Заявник: Піонер Хай-Бред Світцерленд СА

Антоціанове забарвлення гіпокотилу відсутнє. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із слабкою пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабо увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабо виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору. Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, але й чітко округлі, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Висота рослини середня, з відсутнім галуженням. Кошик напівобернений донизу разом з прямим стеблом, за розміром великий, форма з боку сім'янок сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку випробування. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу та Лісостепу 30,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 3,2 - 5,0 ц/га. Вміст жиру 49,1 - 50,0 %, білку 16,5 %. Вихід олії 1546 - 1660 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017036 Робія КС

Степ, Лісостеп

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру з дуже слабкою або відсутньою пухирчастістю, помірними зубцями та вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки-чітко видовжені, але й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 32,2 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,9 ц/га, до національних стандартів 1,1 ц/га; в умовах Лісостепу 29,3 ц/га. Вміст жиру 49,0 - 49,5 %, білку 17,2 - 17,4 %. Вихід олії 1514 - 1674 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 06017038 Романс

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Гіпокотиль з помірним антоціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору відсутньою або дуже слабкою

пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки загострена. Листок з великими вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою висока. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Кошик середній, злека випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, тонка, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 25,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,5 ц/га; в зоні Лісостепу 27,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,6 ц/га. Вміст жиру 49,9 - 50,1%, білку 16,0 - 16,6%. Вихід олії 1364 - 1384 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи. За час випробування ураження хворобами, пошкодження шкідниками незначне.

Лісостеп.

® 06017039 Рюрик

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Гіпокотиль з сильним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю та грубими зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки широкотрикутна. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. За період випробування середня урожайність в зоні Лісостепу становила 26,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,3 ц/га. Вміст жиру 50,0%, білку 16,2%. Вихід олії 1421 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий проти посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

Степ, Лісостеп

07017055 Раут

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію помірна. Листок середнього розміру з помірно пухирчастістю, помірними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка сильно увігнута. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки чітко видовжена, але й чітко округла, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природною висотою середня, галушення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,3 ц/га; в зоні Лісостепу 22,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,4