

заокруглену форму верхівки.

□Забарвлення квітки – біле.

□Біб середньої довжини, вузький за шириною, має слабкозігнуту форму верхівки. Забарвлення бобу – коричневе.

□Насінина – овальної форми з основним жовто-зеленим забарвленням оболонки. Рубчик насітини чорного кольору, овальної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

□Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 18,1 ц/га з вмістом жиру 18,4%, білку – 42,9%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 13,5 см.

Стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами, середньостійкий до посухи.

07018015 Десна

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут сої"

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотилля, жовто-коричневим опушенням, з параметрами висоти від низької до середньої, мають проміжний тип росту, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, ранні час початку цвітіння та середньоранній достигання з наявним опаданням листя.

□Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

□Листок – помірного зеленого кольору та з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має загострену форму верхівки.

□Забарвлення квітки – фіолетове.

□Біб середньої довжини та вузький, слабкозігнутої форми. Забарвлення бобу – світло-коричнєве.

□Насінина – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насітини також жовтого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

□Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,2 ц/га, Лісостепу – 21,8 ц/га, Полісся – 21,8 ц/га. Вміст жиру відповідно – 20,7; 21,0; 21,2%. Вміст білку відповідно – 39,9; 38,8; 37,3%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 9-12 см. Маса 1000 насінин – 147,5-189,5 г.

Стійкий до вилягання, осипання та посухи.

® 06018010 Данко

Степ

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Гіпокотиль у рослин сорту з наявним антоціановим забарвленням. Рослини сорту мають висоту від середньої до високої (91-110 см), проміжний тип росту та жовто-коричнєве опушення, слабкий ступінь завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середньо-ранній час початку і цвітіння, і достигання з наявним опаданням листя.

Стебло нефасційоване, тонке (менше 7,0 мм), має середню кількість вузлів (10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок середній за розміром, овальної форми із загостреною формою верхівки.

Квітка має фіолетове забарвлення віночка. Біб світло-коричневого кольору, має слабкозігнуту форму, середні показники довжини (40,1-50,0 мм) і вузький (менше 9,0 мм).

Насінина овально-видовженої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та частково чорним забарвленням рубчика.

Рубчик лінійної форми з наявним вічком та відсутнім малюнком біля нього.

Маса 1000 зерен – середня (131-190 г).

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 24,4 ц/га з вмістом жиру 19,6%, білку – 41,6%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 14,1 см. Маса 1000 насінин – 146,2 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

07018016 Либідь

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут сої"

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотилля, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання стебла, напівстиснуту форму куща, ранні час початку цвітіння та досягання та з наявним опаданням листя.

☐ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

☐ Листок – помірного зеленого кольору та з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має заокруглену форму верхівки.

☐ Забарвлення квітки – фіолетове.

☐ Біб середньої довжини, вузький, має слабозігнуту форму. Забарвлення бобу – світле.

☐ Насінина – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінина чорного кольору, лінійної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.

☐ Маса 1000 зерен – середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 23,4 ц/га, Лісостепу – 25,3 ц/га, Полісся – 23,0 ц/га. Вміст жиру відповідно – 20,3; 20,8; 21,8%. Вміст білку відповідно – 40,0; 39,2; 36,6%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 11-12 см. Маса 1000 насінин – 157,2-180,8 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи.

07018017 Лариса

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотилля, жовто-коричневим опушенням, з параметрами висоти від низької до середньої, мають індетермінантний тип росту, відсутнє або дуже слабке завивання стебла, стиснуту форму куща, ранній час початку цвітіння та від дуже раннього до раннього – досягання з наявним опаданням листя.

☐ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

☐ Листок – помірно-зеленого кольору зі слабкою пухирчастістю. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має заокруглену форму верхівки.

☐ Забарвлення квітки – біле.

☐ Біб середньої довжини та вузький, слабкозігнутої форми. Забарвлення бобу – світле.

☐ Насінина – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінина чорного кольору, клиновидної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

☐ Насіння за масою 1000 зерен – дрібне.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 18,7 ц/га, Лісостепу – 21,5 ц/га, Полісся – 21,3 ц/га. Вміст жиру

Степ, Лісостеп, Полісся

Степ, Лісостеп, Полісся