

пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки загострена. Листок з великими вушками та відсутніми або слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою висока. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Кошик середній, злека випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, тонка, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 25,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,5 ц/га; в зоні Лісостепу 27,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,6 ц/га. Вміст жиру 49,9 - 50,1%, білку 16,0 - 16,6%. Вихід олії 1364 - 1384 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи. За час випробування ураження хворобами, пошкодження шкідниками незначне.

® 06017039 Рюрик

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Гіпокотиль з сильним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного кольору відсутнього або дуже слабого пухирчастістю та грубими зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки широкотрикутна. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті.

Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. За період випробування середня урожайність в зоні Лісостепу становила 26,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,3 ц/га. Вміст жиру 50,0%, білку 16,2%. Вихід олії 1421 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий проти посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

07017055 Раут

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу помірна. Листок середнього розміру з помірно пухирчастістю, помірними зубцями та великими вушками. Форма попережного розрізу листка сильно увігнута. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки-чітко видовжена, але й чітко округла, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природною висотою середня, галузження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,3 ц/га; в зоні Лісостепу 22,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,4

Лісостеп.

Степ, Лісостеп