

пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки загострена. Листок з великими вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою чітко округлі. Довжина верхівки коротка. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою висока. Положення кошика напівобернене донизу разом із стеблом. Кошик середній, злека випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, тонка, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 25,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,5 ц/га; в зоні Лісостепу 27,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,6 ц/га. Вміст жиру 49,9 - 50,1%, білку 16,0 - 16,6%. Вихід олії 1364 - 1384 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи. За час випробування ураження хворобами, пошкодження шкідниками незначне.

® 06017039 Рюрик

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Гіпокотиль з сильним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору відсутньою або дуже слабкою пухирчастістю та грубими зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки широкотрикутна. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. За період випробування середня урожайність в зоні Лісостепу становила 26,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,3 ц/га. Вміст жиру 50,0%, білку 16,2%. Вихід олії 1421 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий проти посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за час випробування незначне.

07017055 Раут

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію помірна. Листок середнього розміру з помірно пухирчатістю, помірними зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка сильно увігнута. Опушеність верхівки стебла сильна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки чітко видовжена, але й чітко округла, верхівка коротка, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природною висотою середня, галушення відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки дуже сильна, смугастість між краями слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Гібрид відрізняється високим вмістом олеїнової кислоти. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 25,3 ц/га; в зоні Лісостепу 22,9 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,4

Лісостеп.

Степ, Лісостеп

ц/га. Вміст жиру 49,4 %, білку 16,7 %, олеїнової кислоти 79,3 - 83,6 %. Вихід олії 1320 - 1440 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® **07017004 Регіон**

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром зі слабкою пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка загострена, крила листка майже відсутні, помірна наявність вушок. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) дуже сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцеподібної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко округлої та видовженої форми, довжина верхівки коротка, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини високі, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром середній, форма з боку сім'янок сильно випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, тонка чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила: в зоні Степу 26,4 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 0,8 ц/га, до національних стандартів 3,6 ц/га; в зоні Лісостепу 28,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,7 ц/га. Вміст жиру 49,9 - 50,8%, білку 16,0 - 16,2%. Вихід олії 1376 - 1454 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

® **07017009 PIMI 2**

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору слабкою пухирчастістю та грубими зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з дуже великими вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками гострий. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, плоскі, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою низька. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Скоростиглий гібрид. За період випробування середня урожайність становила: в зоні Степу 28,6 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 3,0 ц/га, до національних стандартів 5,8 ц/га; в зоні Лісостепу 28,5 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 0,6 ц/га, до національних стандартів 3,1 ц/га. Вміст жиру 48,6 - 50,4%, білку 16,2 - 16,7%. Вихід олії 1294 - 1624 кг/га. Гібрид стійкий до гербіцидів групи IMI, відносно стійкий проти вилягання та посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

06017041 Сорока

Степ, Лісостеп

Заявник: Науково-дослідний центр "Магроселект"

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію помірна. Листок за розміром великий із слабкою пухирчатістю, помірними зубцями