

ц/га. Вміст жиру 49,4 %, білку 16,7 %, олеїнової кислоти 79, 3 - 83,6 %. Вихід олії 1320 - 1440 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 07017004 Регіон

Степ, Лісостеп

Заявник:

Інститут олійних культур Української академії аграрних наук

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром зі слабкою пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабо увігнута, верхівка загострена, крила листка майже відсутні, помірної наявності вушок. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) дуже сильна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцеподібної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору.

Трубчасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку.

Зовнішні листки обгортки чітко округлі та видовженої форми, довжина верхівки коротка, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик.

Рослини високі, з відсутнім галузненням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром середній, форма з боку сім'янок сильно випукла.

Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, тонка чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила: в зоні Степу 26,4 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 0,8 ц/га, до національних стандартів 3,6 ц/га; в зоні Лісостепу 28,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,7 ц/га. Вміст жиру 49,9 - 50,8%, білку 16,0 - 16,2%. Вихід олії 1376 - 1454 кг/га. Гібрид відносно стійкий проти вилягання та посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

® 07017009 PIMI 2

Степ, Лісостеп

Заявник:

Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору слабкою пухирчастістю та грубими зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з дуже великими вушками та відсутніми або слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками гострий. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірної. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, плоскі, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубчасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення кошика відносно стебла злегка охоплює. Рослина за природною висотою низька. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Скоростиглий гібрид. За період випробування середня урожайність становила: в зоні Степу 28,6 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 3,0 ц/га, до національних стандартів 5,8 ц/га; в зоні Лісостепу 28,5 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 0,6 ц/га, до національних стандартів 3,1 ц/га. Вміст жиру 48,6 - 50,4%, білку 16,2 - 16,7%. Вихід олії 1294 - 1624 кг/га. Гібрид стійкий до гербіцидів групи ІМІ, відносно стійкий проти вилягання та посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

06017041 Сорока

Степ, Лісостеп

Заявник:

Науково-дослідний центр "Магроселект"

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу помірна. Листок за розміром великий із слабкою пухирчастістю, помірними зубцями