

Маса 1000 зерен – середня (131-190 г).

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 24,4 ц/га з вмістом жиру 19,6%, білку – 41,6%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 14,1 см. Маса 1000 насінин – 146,2 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

07018016 Либідь Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут сої"

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотили, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання стебла, напівстиснуту форму куща, ранні час початку цвітіння та досягання та з наявним опаданням листя.

☐ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

☐ Листок – помірного зеленого кольору та з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, овальний та

має заокруглену форму верхівки.

☐ Забарвлення квітки – фіолетове.

☐ Біб середньої довжини, вузький, має слабозігнуту форму. Забарвлення бобу – світле.

☐ Насінина – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини чорного кольору, лінійної форми з

наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.

☐ Маса 1000 зерен – середня.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 23,4 ц/га, Лісостепу – 25,3 ц/га, Полісся – 23,0 ц/га. Вміст жиру відповідно – 20,3; 20,8; 21,8%. Вміст білку відповідно – 40,0; 39,2; 36,6%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 11-12 см. Маса 1000 насінин – 157,2-180,8 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи.

07018017 Лариса Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут польовництва та овоочівництва, м. Нові Сад

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотили, жовто-коричневим опушенням, з параметрами висоти від низької до середньої, мають індетермінантний тип росту, відсутнє або дуже слабе завивання стебла, стиснуту форму куща, ранній час початку цвітіння та від дуже раннього до раннього – досягання з наявним опаданням листя.

☐ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

☐ Листок – помірно-зеленого кольору зі слабкою пухирчастістю. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має

заокруглену форму верхівки.

☐ Забарвлення квітки – біле.

☐ Біб середньої довжини та вузький, слабкозігнутої форми. Забарвлення бобу – світле.

☐ Насінина – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини чорного кольору, клиновидної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

☐ Насіння за масою 1000 зерен – дрібне.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 18,7 ц/га, Лісостепу – 21,5 ц/га, Полісся – 21,3 ц/га. Вміст жиру