

та вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми, довгі. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галузження кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між крайми сім'янки дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,7 ц/га; в умовах Лісостепу 27,0 ц/га, гарантована прибавка 1,7 ц/га. Вміст жиру 50,2 - 50,9 %, білку 15,8 - 16,7 %. Вихід олії 1421 - 1488 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017057 Селлор

Заявник: Р2Н

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру з помірними пухирчатістю, зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка сильно увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжені, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галузження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між крайми сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 31,4 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,8 ц/га, до національних стандартів 3,5 ц/га; в умовах Лісостепу 29,8/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,7 ц/га. Вміст жиру 50,1 - 51,5 %, білку 15,7 - 16,4 %. Вихід олії 1644 - 1684 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017063 Сан Лука

Заявник: Добружанський Сільськогосподарський Інститут

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із слабкою пухирчатістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабо увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабо виражені, вушка помірні. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням зігнуті за довжиною, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору. Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, але й чітко округлі, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Висота рослин середня, з відсутнім галузженням. Кошик напівобернений донизу разом з прямим стеблом, за розміром середній, форма з боку сім'янок сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, тонка чорного кольору. Смугастість на краях відсутня або дуже слабка, сірого кольору, між крайми смугастість відсутня або дуже слабка.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 27,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,7 ц/га; в зоні Лісостепу 24,6 ц/га, гарантована прибавка 4,1 ц/га. Вміст жиру 49,4 - 49,8 %, білку 16,5 - 16,8 %, вихід олії 1428 - 1512 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами та пошкодження шкідниками

Степ, Лісостеп

Степ, Лісостеп