

та вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми, довгі. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки дуже слабка, колір смужок сірий.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 27,6 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,7 ц/га; в умовах Лісостепу 27,0 ц/га, гарантована прибавка 1,7 ц/га. Вміст жиру 50,2 - 50,9 %, білку 15,8 - 16,7 %. Вихід олії 1421 - 1488 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017057 Селлор

Заявник: Р2н

Степ, Лісостеп

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу слабка. Листок середнього розміру з помірними пухирчатістю, зубцями та великими вушками. Форма поперечного розрізу листка сильно увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях та між краями сім'янки слабка, колір смужок сірий.

Середньоранній гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 31,4 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,8 ц/га, до національних стандартів 3,5 ц/га; в умовах Лісостепу 29,8/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,7 ц/га. Вміст жиру 50,1 - 51,5 %, білку 15,7 - 16,4 %. Вихід олії 1644 - 1684 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

07017063 Сан Лука

Заявник: Добружанський Сільськогосподарський Інститут

Степ, Лісостеп

Гіпокотиль з наявним слабким антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із слабкою пухирчатістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабко увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабко виражені, вушка помірні. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням зігнуті за довжиною, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору. Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки за формою чітко видовжені, але й чітко округлі, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Висота рослин середня, з відсутнім галуженням. Кошик напівобернений донизу разом з прямим стеблом, за розміром середній, форма з боку сім'янок сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, тонка чорного кольору. Смугастість на краях відсутня або дуже слабка, сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Ранньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 27,4 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,7 ц/га; в зоні Лісостепу 24,6 ц/га, гарантована прибавка 4,1 ц/га. Вміст жиру 49,4 - 49,8 %, білку 16,5 - 16,8 %, вихід олії 1428 - 1512 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, ураження хворобами та пошкодження шкідниками

за період випробування незначне.

® 08017009 Сілуєт

Степ, Лісостеп

Заявник: ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед

Гіпокотиль з наявним помірним антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із помірною пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабо увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабо виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору. Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки чітко видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Рослини низькі, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром маленький, форма з боку сім'янок сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за період випробування становила в умовах Степу 31,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 6,9 ц/га; в умовах Лісостепу 27,1 ц/га, гарантована прибавка 2,9 ц/га. Вміст жиру 49,7 - 50,5%, білку 16,1 - 16,9%. Вихід олії 1406 - 1524 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання та посухи, ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017035 Тунка

Степ

Заявник: Лімагрейн Юроп

Гіпокотиль з слабким аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору, помірною пухирчастістю та грубими зубцями. Форма листка у поперечному розрізі плеската. Листок з помірними вушками та слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, плоскі, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою висока. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькоюяйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньостиглий високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 28,9 ц/га, гарантована прибавка до національного стандарту 2,8 ц/га. Вміст жиру 48,4%, олеїнової кислоти 82%, білку 17,2%. Вихід олії 1492 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017051 Тітанік-ПР

Степ

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилію - помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка - слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькоюяйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені але й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене