

за період випробування незначне.

® 08017009 Сілуєт

Степ, Лісостеп

Заявник: ТерраВіта (Оувесіз) Лімітед

Гіпокотиль з наявним помірним антоціановим забарвленням. Листок помірного зеленого кольору, середній за розміром із помірною пухирчастістю. Зубці помірні. У поперечному розрізі форма листка слабо увігнута, верхівка загострена, крила листка відсутні або слабо виражені, вушка великі. Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидної форми, за положенням плоскі, середні за довжиною, помірно-жовтого кольору. Трубочасті квітки оранжевого кольору з відсутнім антоціановим забарвленням приймочки, з наявним продукуванням пилку. Зовнішні листки обгортки чітко видовженої форми, довжина верхівки середня, з зовнішнього боку помірного зеленого кольору, злегка охоплюють кошик. Рослини низькі, з відсутнім галуженням. Кошик обернений донизу з легким викривленням стебла, за розміром маленький, форма з боку сім'янок сильно випукла. Сім'янка середнього розміру, вузько яйцеподібної форми, середня чорного кольору. Має слабку смугастість на краях сірого кольору, між краями смугастість відсутня або дуже слабка.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за період випробування становила в умовах Степу 31,3 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 6,9 ц/га; в умовах Лісостепу 27,1 ц/га, гарантована прибавка 2,9 ц/га. Вміст жиру 49,7 - 50,5%, білку 16,1 - 16,9%. Вихід олії 1406 - 1524 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання та посухи, ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017035 Тунка

Степ

Заявник: Лімагрейн Юроп

Гіпокотиль з слабким антоціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору, помірною пухирчастістю та грубими зубцями. Форма листка у поперечному розрізі плеската. Листок з помірними вушками та слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки стебла на рівні відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, плоскі, вузько-яйцевидні, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою висока. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, сильно випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, чорна з сірими смужками.

Середньостиглий високоолеїновий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 28,9 ц/га, гарантована прибавка до національного стандарту 2,8 ц/га. Вміст жиру 48,4%, олеїнової кислоти 82%, білку 17,2%. Вихід олії 1492 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017051 Тітанік-ПР

Степ

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу - помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці дрібні, вушка помірні. Форма поперечного розрізу листка - слабо увігнута. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно жовті, вузькояйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки жовті, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені але й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина середньої висоти, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене

донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - плеската. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 27,2 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,8 ц/га. Вміст жиру 49,0%, білку 17,0 %. Вихід олії 1450 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017058 Трубіж

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу - слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки щільні, помірно жовті, веретеновидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, але й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина низька, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 23,0 ц/га, в зоні Лісостепу 24,5 ц/га. Вміст жиру 50,7%, білку 16,5%. Вихід олії 1344 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017073 Федот

Степ, Лісостеп

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю агропромислова фірма "Еліта Дона"

Гіпокотиль з сильним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик за розміром середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, тонка, чорна з сірими смужками.

Скоростиглий гібрид на стерильній основі. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 23,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,0 ц/га; в зоні Лісостепу 26,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,7 ц/га. Вміст жиру 50,9 - 51,2 %, білку 15,3 - 15,7%. Вихід олії 1363 - 1408 кг/га. Гібрид стійкий до полягання та посухи, відносно стійкий до ураження хворобами.

07017085 Фушія КЛ

Степ

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Гіпокотиль з слабкою інтенсивністю аноціанового забарвлення. Листок за розміром середній, помірного зеленого кольору з слабкою