

донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - плеската. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібною форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 27,2 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,8 ц/га. Вміст жиру 49,0%, білку 17,0 %. Вихід олії 1450 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

Степ, Лісостеп

07017058 Трубіж

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу - слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперекового розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки щільні, помірно жовті, веретеновидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, але й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина низька, галузнення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібною форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 23,0 ц/га, в зоні Лісостепу 24,5 ц/га. Вміст жиру 50,7%, білку 16,5%. Вихід олії 1344 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

Степ, Лісостеп

06017073 Федот

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю агропромислова фірма "Еліта Дона"

Гіпокотиль з сильним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперековому розрізі слабко увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Галузнення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик за розміром середній, злегка випуклою форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, тонка, чорна з сірими смужками.

Скоростиглий гібрид на стерильній основі. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 23,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,0 ц/га; в зоні Лісостепу 26,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,7 ц/га. Вміст жиру 50,9 - 51,2 %, білку 15,3 - 15,7%. Вихід олії 1363 - 1408 кг/га. Гібрид стійкий до полягання та посухи, відносно стійкий до ураження хворобами.

07017085 Фушія КЛ

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Гіпокотиль з слабкою інтенсивністю аноціанового забарвлення. Листок за розміром середній, помірного зеленого кольору з слабкою

Степ