

донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - плеската. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 27,2 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 2,8 ц/га. Вміст жиру 49,0%, білку 17,0 %. Вихід олії 1450 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання, посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017058 Трубіж

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу - слабка. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, зубці дрібні, вушка великі. Форма поперечного розрізу листка - плеската. Опушеність верхівки стебла помірна. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки щільні, помірно жовті, веретеновидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжені, але й чітко округлі, верхівка середньої довжини, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки - помірний. Рослина низька, галуження відсутнє. Положення кошика - обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика - середній, форма кошика (з боку сім'янок) - злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, вузькояйцеподібної форми, за основним кольором - чорна, смугастість на краях сім'янки відсутня або дуже слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Скоростиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за роки випробування становила в зоні Степу 23,0 ц/га, в зоні Лісостепу 24,5 ц/га. Вміст жиру 50,7%, білку 16,5%. Вихід олії 1344 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання; ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

06017073 Федот

Степ, Лісостеп

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю агропромислова фірма "Еліта Дона"

Гіпокотиль з сильним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабко увігнута, форма верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабко вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик за розміром середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, широкояйцеподібна, тонка, чорна з сірими смужками.

Скоростиглий гібрид на стерильній основі. Середня урожайність за період випробування становила в зоні Степу 23,8 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,0 ц/га; в зоні Лісостепу 26,1 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 0,7 ц/га. Вміст жиру 50,9 - 51,2 %, білку 15,3 - 15,7%. Вихід олії 1363 - 1408 кг/га. Гібрид стійкий до полягання та посухи, відносно стійкий до ураження хворобами.

07017085 Фушія КЛ

Степ

Заявник: Коссад Семанс ЕС А

Гіпокотиль з слабкою інтенсивністю аноціанового забарвлення. Листок за розміром середній, помірного зеленого кольору з слабкою

пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки загострена. Листок з великими вушками та слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин) на рівні. Стебло опушеність верхівки (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності. Язичкові квітки вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі, довжина верхівки середня. Зовнішні листки обгортки з помірним зеленим кольором зовнішнього боку. Зовнішні листки обгортки положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній. Форма кошику з боку сім'янок злегка випукла. Сім'янка за розміром середня, вузькояйцеподібна. Сім'янка середня, чорна з сірими смужками.

Середньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 31,9 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,5 ц/га, до національного 0,8 ц/га. Вміст жиру 48,3%, білку 17,1%. Вихід олії 1429 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017054 ЦОДТ5210

Степ, Лісостеп

Заявник: Дікманн ГмбХ і Ко. КГ

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилу помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, помірними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки - чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природною висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, широко-яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 28,7 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,0 ц/га; в зоні Лісостепу 26,8 ц/га, гарантована прибавка 0,9 ц/га. Вміст жиру 50,0 - 50,6 %, білку 16,4 - 16,6 %. Вихід олії 1351 - 1628 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 06017075 Яніна

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Гіпокотиль з помірним антоціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута та формою верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, тонка, чорна з сірими смужками.