

пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута, форма верхівки загострена. Листок з великими вушками та слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин) на рівні. Стебло опушеність верхівки (останні 5 см) помірна. Час цвітіння середній. Язичкові квітки середньої щільності. Язичкові квітки вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі, довжина верхівки середня. Зовнішні листки обгортки з помірним зеленим кольором зовнішнього боку. Зовнішні листки обгортки положення відносно кошика злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Галуження відсутнє. Положення кошика напівобернене донизу разом із прямим стеблом. Кошик середній. Форма кошику з боку сім'янок злегка випукла. Сім'янка за розміром середня, вузькояйцеподібна. Сім'янка середня, чорна з сірими смужками.

Середньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування в зоні Степу становила 31,9 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,5 ц/га, до національного 0,8 ц/га. Вміст жиру 48,3%, білку 17,1%. Вихід олії 1429 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий до посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

07017054 ЦОДТ5210

Степ, Лісостеп

Заявник: Дікманн ГмБХ і Ко. КГ

Інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилю помірна. Листок середнього розміру з слабкою пухирчастістю, помірними зубцями та помірними вушками. Форма поперечного розрізу листка плеската. Опушеність верхівки стебла слабка. Час цвітіння ранній. Язичкові квітки середньої щільності, помірно-жовті, вузько-яйцевидної форми та середньої довжини. Трубочасті квітки оранжеві, антоціанове забарвлення приймочки відсутнє. Форма зовнішніх листків обгортки- чітко видовжена, верхівка середня, зелений колір зовнішнього боку листків обгортки помірний. Рослина за природною висотою середня, галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла, розмір кошика середній, форма кошика (з боку сім'янок) злегка випукла. Сім'янка середнього розміру, широко- яйцеподібної форми, за основним кольором чорна, смугастість на краях сім'янки слабка, смугастість між краями відсутня або дуже слабка, колір смужок сірий.

Середньостиглий гібрид олійного напрямку використання. Середня урожайність за час випробування становила в зоні Степу 28,7 ц/га, гарантована прибавка до національних стандартів 1,0 ц/га; в зоні Лісостепу 26,8 ц/га, гарантована прибавка 0,9 ц/га. Вміст жиру 50,0 - 50,6 %, білку 16,4 - 16,6 %. Вихід олії 1351 - 1628 кг/га. Гібрид стійкий до вилягання, осипання. Ураження хворобами та пошкодження шкідниками за період випробування незначне.

® 06017075 Яніна

Степ, Лісостеп

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Гіпокотиль з помірним аноціановим забарвленням. Листок середній, помірного зеленого кольору з слабкою пухирчастістю та помірними зубцями. Форма листка у поперечному розрізі слабо увігнута та формою верхівки від широкотрикутної до загостреної. Листок з помірними вушками та відсутніми або слабо вираженими крилами. Листок кут між найнижчими бічними жилками прямий або близький до прямого. Висота верхівки листка вище відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослин). Опушеність верхівки стебла (останні 5 см) слабка. Язичкові квітки середньої щільності, вузько-яйцевидні, плоскі, середні, помірно-жовті. Трубочасті квітки оранжеві. Продукування пилку наявне. Зовнішні листки обгортки за формою також чітко видовжені, але й чітко округлі. Довжина верхівки середня. Зелений колір зовнішнього боку листка обгортки помірний. Положення відносно кошика не охоплює або злегка охоплює. Рослина за природною висотою середня. Галуження відсутнє. Положення кошика обернене донизу разом із легким викривленням стебла. Кошик середній, злегка випуклої форми з боку сім'янок. Сім'янка середня, вузькояйцеподібна, тонка, чорна з сірими смужками.

Ранньостиглий гібрид. Середня урожайність за період випробування становила - в зоні Степу 29,1 ц/га, гарантована прибавка до умовного стандарту 1,1 ц/га, да національних стандартів 4,2 ц/а; в зоні Лісостепу 29,4 ц/га - гарантована прибавка до умовного стандарту 1,4 ц/га, до національних стандартів 4,1 ц/га. Вміст жиру 50,0 - 50,7%, білку 15,7 - 16,9 %. Вихід олії 1483 - 1519 кг/га. Гібрид стійкий проти вилягання, відносно стійкий проти посухи. За час випробування ураження хворобами та пошкодження шкідниками незначне.

Со́я

07018008 Антарес

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннізнавства та сортовивчення Української академії аграрних наук

Ідентифікаційний опис. Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотилля, сірим опушенням, параметрами висоти від середньої до високої, мають ін детермінантний тип росту, середній ступінь завивання стебла, напіввстиснуту форму куща, середні час початку цвітіння та досягання та з відсутнім опаданням листя.

- Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.
- Листок – темно-зеленого кольору та зі слабким ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, клиновидний та має заокруглену форму верхівки.
- Забарвлення квітки – фіолетове.
- Біб має середні параметри довжини та ширини, серповидну форму. Забарвлення бобу – світле.
- Насінина – округло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінина світло-коричневого кольору, лінійної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.
- Маса 1000 зерен – середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 18,6 ц/га, Лісостепу – 19,8 ц/га, Полісся – 17,4 ц/га. Вміст жиру відповідно – 18,5; 18,8; 19,1%. Вміст білку відповідно – 40,0; 40,2; 38,0%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 12-19 см. Маса 1000 насінин – 102,5-153,0 г.

Середньостійкий до вилягання. Стійкий до осипання та посухи.

® 06018008 Антошка

Степ

Заявник: Приватне підприємство "Наукова селекційно-насінницька фірма "Сосвий вік"

Гіпокотиль у рослин сорту з відсутнім антоціановим забарвленням. Висота рослин сорту знаходиться в межах від середньої до високої (91-110 см) та мають проміжний тип росту, сіре опушенням, середній ступінь завивання стебла, проміжну форму куща, середній час початку цвітіння і середній досягання з наявним опаданням листя.

Стебло нефасційоване, середньої товщини (7,0-12,0 мм), має середню кількість вузлів 10-15 шт.). Листок помірно зеленого кольору з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок великий за розміром, ланцетовидної форми із загосреною формою верхівки.

Квітка має біле забарвлення віночка. Біб світлого кольору, має серповидну форму та середні показники і довжини (40,1-50,0 мм), і ширини (9,1-12,0 мм).

Насінина овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки та жовтим забарвленням рубчика.

Рубчик лінійної форми без вічком на ньому і без малюнка (смужок) навколо нього.

Маса 1000 зерен – середня (131-190 г).

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 19,9 ц/га з вмістом жиру 18,2%, білку – 42,6%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 14,8 см. Маса 1000 насінин – 149,2 г.