

Маса 1000 зерен – середня (131-190 г).

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 24,4 ц/га з вмістом жиру 19,6%, білку – 41,6%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 14,1 см. Маса 1000 насінин – 146,2 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

07018016 Либідь

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний інститут сої"

Рослини сорту з наявним антоціановим забарвленням гіпокотилля, жовто-коричневим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, відсутній або дуже слабкий ступінь завивання стебла, напівстиснуту форму куща, ранній час початку цвітіння та досягання та з наявним опаданням листя.

☐ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, середньої товщини.

☐ Листок – помірного зеленого кольору та з помірним ступенем пухирчастості. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має заокруглену форму верхівки.

☐ Забарвлення квітки – фіолетове.

☐ Біб середньої довжини, вузький, має слабозігнуту форму. Забарвлення бобу – світле.

☐ Насінина – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінина чорного кольору, лінійної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.

☐ Маса 1000 зерен – середня.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 23,4 ц/га, Лісостепу – 25,3 ц/га, Полісся – 23,0 ц/га. Вміст жиру відповідно – 20,3; 20,8; 21,8%. Вміст білку відповідно – 40,0; 39,2; 36,6%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 11-12 см. Маса 1000 насінин – 157,2-180,8 г.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи.

07018017 Лариса

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Інститут польовництва та овочівництва, м. Нові Сад

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотилля, жовто-коричневим опушенням, з параметрами висоти від низької до середньої, мають індетермінантний тип росту, відсутнє або дуже слабке завивання стебла, стиснуту форму куща, ранній час початку цвітіння та від дуже раннього до раннього – досягання з наявним опаданням листя.

☐ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

☐ Листок – помірно-зеленого кольору зі слабкою пухирчастістю. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має заокруглену форму верхівки.

☐ Забарвлення квітки – біле.

☐ Біб середньої довжини та вузький, слабкозігнутої форми. Забарвлення бобу – світле.

☐ Насінина – овальної форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінина чорного кольору, клиновидної форми з наявним вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – наявний.

☐ Насіння за масою 1000 зерен – дрібне.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 18,7 ц/га, Лісостепу – 21,5 ц/га, Полісся – 21,3 ц/га. Вміст жиру

відповідно – 20,8; 21,2; 21,9%. Вміст білку відповідно – 39,9; 38,3; 37,1%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 9-14 см. Маса 1000 насінин – 149,0-201,4 г.

Стійкий до вилягання та осипання. Середньостійкий до посухи.

07018001 ПВС 008

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Сіркл Сі Сідс Інк.

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотилля, сірим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, слабе завивання стебла, проміжну форму куща, ранній час і початку цвітіння, і досягання з наявним опаданням листя.

☐ Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.

☐ Листок – помірно-зеленого кольору зі помірною пухирчастістю. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має заокруглену форму верхівки.

☐ Забарвлення квітки – біле.

☐ Біб середньої довжини та вузький, слабкозігнутої форми. Забарвлення бобу – світло-коричневе.

☐ Насінина – округло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінина жовтого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.

☐ Насіння за масою 1000 зерен – середнє.

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 22,2 ц/га, Лісостепу – 23,6 ц/га, Полісся – 21,6 ц/га з вмістом жиру відповідно 20,3%, 21,4% і 21,6%, білку – 38,4%, 37,9% і 35,4%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 10,8-14,1 см.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

07018003 Спонсор

Степ, Лісостеп, Полісся

Заявник: Євраліс Семанс

Гіпокотиль у рослин сорту без антоціанового забарвлення. Висота рослин знаходиться в межах від середньої до високої (91-110 см). Рослини мають проміжний тип росту з жовто-коричневим опушенням, середнім ступенем завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середньопізній час початку цвітіння і середній час досягання з наявним опаданням листя.

Стебло нефасційоване, середньої товщини (7,0-12,0 мм), з середньою кількістю вузлів (10-15 шт.). Листок зеленого кольору від помірної до темної інтенсивності його прояву та ступенем пухирчастості від відсутньої або дуже слабкої до слабкої. Середній листочок великий за розміром, овальний із загостреною формою верхівки.

Квітка має біле забарвлення віночка. Біб темно-коричневого кольору, прямий за формою, короткий за довжиною (менше 40,0 мм) і вузький (менше 9,0 мм).

Насінина округло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та темно-коричневим забарвленням рубчика.

Рубчик овальної форми без вічка на ньому.

Маса 1000 зерен – середня (131- 190 г).

Напрямок використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,2 ц/га, Лісостепу – 21,8 ц/га, Полісся – 21,8 ц/га. Вміст жиру відповідно – 20,7; 21,0; 21,2%. Вміст білку відповідно – 39,9; 38,8; 37,3%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 9-12 см. Маса 1000 насінин – 147,5-189,5 г.

Стійкий до вилягання, осипання та посухи.