

відповідно – 20,8; 21,2; 21,9%. Вміст білку відповідно – 39,9; 38,3; 37,1%.  
Висота прикріплення нижнього бобу у межах 9-14 см. Маса 1000 насінин – 149,0-201,4 г.  
Стійкий до вилягання та осипання. Середньостійкий до посухи.

### 07018001 ПВС 008

Заявник: Сіркл Сі Сідс Інк.

Рослини сорту з відсутнім антоціановим забарвленням гіпокотилля, сірим опушенням, середньої висоти, мають проміжний тип росту, слабе завивання стебла, проміжну форму куща, ранній час і початку цвітіння, і достигання з наявним опаданням листя.

- Стебло з середньою кількістю вузлів, нефасційоване, тонке.
- Листок – помірно-зеленого кольору зі помірною пухирчастістю. Середній листочок за розміром – середній, овальний та має заокруглену форму верхівки.
- Забарвлення квітки – біле.
- Біб середньої довжини та вузький, слабкозигнутої форми. Забарвлення бобу – світло-коричневе.
- Насінина – округло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки. Рубчик насінини жовтого кольору, лінійної форми з відсутнім вічком на ньому. Малюнок (смужки) навколо рубчика – відсутній.
- Насіння за масою 1000 зерен – середнє.

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування у зоні Степу – 22,2 ц/га, Лісостепу – 23,6 ц/га, Полісся – 21,6 ц/га з вмістом жиру відповідно 20,3%, 21,4% і 21,6%, білку – 38,4%, 37,9% і 35,4%.

Висота прикріплення нижнього бобу – 10,8-14,1 см.

Стійкий до вилягання, осипання, посухи, ураження хворобами.

### 07018003 Спонсор

Заявник: Евраліс Семанс

Гіпокотиль у рослин сорту без антоціанового забарвлення. Висота рослин знаходиться в межах від середньої до високої (91-110 см). Рослини мають проміжний тип росту з жовто-коричневим опушенням, середнім ступенем завивання стебла, напівстиснуту форму куща, середньопізній час початку цвітіння і середній час достигання з наявним опаданням листя.

Стебло нефасційоване, середньої товщини (7,0-12,0 мм), з середньою кількістю вузлів (10-15 шт.). Листок зеленого кольору від помірної до темної інтенсивності його прояву та ступенем пухирчастості від відсутньої або дуже слабкої до слабкої. Середній листочок великий за розміром, овальний із загостреною формою верхівки.

Квітка має біле забарвлення віночка. Біб темно-коричневого кольору, прямий за формою, короткий за довжиною (менше 40,0 мм) і вузький (менше 9,0 мм).

Насінина округло-випуклої форми з основним жовтим забарвленням оболонки та темно-коричневим забарвленням рубчика.

Рубчик овальної форми без вічка на ньому.

Маса 1000 зерен – середня (131-190 г).

Напрям використання – зерновий.

Середня врожайність за роки випробування (2008-2010) у зоні Степу – 20,2 ц/га, Лісостепу – 21,8 ц/га, Полісся – 21,8 ц/га. Вміст жиру відповідно – 20,7; 21,0; 21,2%. Вміст білку відповідно – 39,9; 38,8; 37,3%.

Висота прикріплення нижнього бобу у межах 9-12 см. Маса 1000 насінин – 147,5-189,5 г.

Стійкий до вилягання, осипання та посухи.

## Степ, Лісостеп, Полісся

## Степ, Лісостеп, Полісся