

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 11035008 Назва сорту: Монісія **Заявник (код):** 744 **Власник сорту (код):** 744

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.12.2017 **Патент № 170811**

Дата пріоритету: 30.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 15.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160441

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1
2	Рослина: тип росту	детермінантний	1
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	велике	7
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
9	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3
12	Час розвитку жіночих квіток (80 % рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3
13	Рослина: виявлення статі	гіноєційність	3
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1	1
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
16	Партенокарпія	наявна	9
17	Плід: за довжиною	середній	5
18	Плід: діаметр	середній	5
19	Плід: відношення довжина/діаметр	мале	3
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1
22	Плід: форма основи	тупа	3
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0
24	Плід: форма верхівки	округла	3
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1
28	Плід: борозенки	відсутні	1
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9
30	Плід: ступінь зморшкуватості	слабкий	3
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1
34	Плід: горбочки	наявні	9
35	Плід: розмір горбочків	малий	3
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3
37	Плід: плями	наявні	9
38	Плід: характер поширення плям	лише смугами	1
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	1/3 довжини	1
40	Плід: щільність плям	нешільна	3
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i>	ознака не визначалась	0
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	ознака не визначалась	0
46	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	ознака не визначалась	0
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	ознака не визначалась	0
48	Стійкість проти бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	ознака не визначалась	0
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i> (CGMMV))	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність – 85 т/га, вміст сухої речовини у плоді – 6,1 %, тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості – 44 доби, період плодоношення – 38 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.